



番茄夜蛾

會，而降低田間族群密度，並可做為偵測工具，以為防治參考。(四)早期摘除葉上的卵塊及群集的初齡幼蟲，予以殺死。(五)防治藥劑可參考 2.8%畢芬寧乳劑 1000 倍、2.8%賽洛寧乳劑 1000 倍、25.3%美文松乳劑 500 ~ 750 倍。

**薊馬類：**成蟲細小狹長，體長約 1 ~ 2 mm 左右，一般在 10 月至隔年 3 月的季節，發生密度較高。成蟲與若蟲生態習性相似，銼吸植株花器，成蟲並產卵於植株花瓣和較幼嫩組織內，銼吸或產卵會造成花瓣白斑或褐色斑點，影響切花外觀及切花品質甚巨。近年來有愈嚴重的趨勢。

**防治方法：**(一)利用其對色澤之偏好性，懸掛青色或黃色黏帶誘殺薊馬。(二)參考藥劑 2.8%畢芬寧乳劑 1000 倍、2.8%賽洛寧乳劑 1000 倍、35%白克松可濕性粉劑 1000 倍、40%必芬松乳劑 800 倍。同種藥劑噴施 2 - 3 次後，必須更換，以免產生抗藥性。

**蚜蟲類：**俗稱「龜神」，生活史分無性世代和有性世代二種。高屏地區因四季溫和，故全為無性世代胎生雌蟲。蚜蟲主要棲集於花器或幼嫩組織附近，以刺吸式口器吸食汁液，使幼組織枯萎、葉子變形，造成植株衰弱，開花遲緩，且棲群密度高時會大量分泌蜜露，引發煤病，影響植物光合作用。且蚜蟲會傳播胡瓜嵌紋病毒 (CMV) 與菜豆黃化嵌紋病毒 (BYMV) 兩種毒素病，所造成的間接危害，比直接吸食更嚴重。

**防治方法：**(一)注意田間衛生，清除雜草及毒素病植株 (瘋株)，以減少蚜蟲棲息場所和傳播毒素病的機會。(二)種植前可參考施用 3%加保扶粒劑。(三)種植後可參考噴施 90%納乃得 (萬靈) 可濕性粉劑 2000 倍、50%歐殺松乳劑 1500 倍、50%達馬松乳劑 1200 倍予以防治。

**南方綠椿象：**卵淡黃綠色，圓形高約 1 毫米，20 ~ 30 粒或更多整齊排列成行，若蟲聚集成群，體呈紅、黑、黃白顏色之斑點，隨著生長逐漸向四周分散，且體色漸成青綠色。椿象具刺吸式口器，成蟲與幼蟲以吸植物莖葉，造成植株變形、變短，影響植株生長作用。

**防治方法：**發現成蟲，可參考噴灑 50%速滅松乳劑 1000 倍、50%馬拉松乳劑 1000 倍、50%加保利可濕性粉劑 800 倍等藥劑。

唐菖蒲尚有其他害蟲，如葉蟻、柑毒蛾、粉蝨、大螟等，其防治方法，請農友參照以上所述，就各害蟲之同類或相近類屬之推荐方法參考採用。