二次感染源，此病可以化學藥劑25%撲克拉乳劑防除之。

赤斑病：由眞菌所引起，主要爲害葉片，受害之葉片最初產生白色針尖狀退色斑，轉變成紅色小點，之後病斑逐漸擴大。典形之病斑爲橢圓形紅褐色，長度約爲一公分左右，嚴重時多數病斑相互癒合，造成葉片乾枯。球莖亦會被害，一般在溫度12－32℃之間均會發病，但以28℃爲發病最適溫度，所以本病以夏季發生最多。一般防治方法爲使用化學藥劑如－50%撲滅寧可濕性粉劑或75%快得保淨可濕粉劑來防除此病。

灰黴病：眞菌所引起，主要在冬末初春時發生，前期葉片產生白色之退色小斑點，以後轉變成紅色，病斑部稍凹陷，中期病斑逐漸擴大顏色加深，後期轉爲褐色，稍呈方形或長方形，嚴重時病斑亦相互癒合造成葉片枯乾。溼度高時病斑上易發現灰色黴狀物，爲病原菌胞子，花朵罹病初期產生白色小斑點，嚴重時整個花朵呈水浸狀腐爛，其上著生灰色分生胞子，溫度高時會產生小顆粒，是病原菌之菌核。可使用化學劑50%撲滅寧可溼性粉劑或75%快得保淨可溼性粉劑或50%免克寧可溼性粉劑來防治此病。

線蟲病害：唐菖蒲會受到地下部線蟲，包括殘根線蟲、以及釘線蟲爲害根尖。病徵是造成根尖生長停滯、分叉根及根部壞疽的情形；地上部則出現植株矮化、黃化、生育不良、微量元素缺乏症及失水病徵。

可採種苗消毒與土壤消毒之預防，或施灑殺線蟲劑、配合噴灌系統施用殺線蟲劑防治

病毒病害：由嵌紋病毒（Mosaic virus ）所引起葉片上呈現濃綠黃綠相間之病斑。罹病植株須焚毀，凡砍過帶病植株的刀子亦不可用來再切健株，以免傳染。

原則性保護措施

(1)不可私帶種苗進口，避免引進病蟲原。

(2)注意田間管理，除去罹病組織及菌體，使田間病原密度低，亦可降低植株罹病之機率。

(3)輪作：以不同種類植物輪作，或栽種不同品種之花卉，可因病害種類不同而降低土壤中病原菌族群，並降低病害之嚴重性。

(4)施用有機質肥料：於土壤中添加有機質肥料，除可促進植物生長，增進植物之抵抗力外，亦可增進土壤中拮抗菌之生長，降低病害之發生。

(5)土壤消毒：病害發生嚴重時，若其他方法無法達到防治效果時，可進行土壤消毒；但因土壤消毒會破壞整個土壤微生物相，若不幸再度將病原菌引進時，病害將較未消毒更加嚴重，不可不慎。常用之方法有：Ⅰ、化學藥劑法。II、乾熱消毒。III、溼熱消毒。IV、曝晒法。

(6)貯運過程中避免傷及植物組織。

(7)選用不帶菌之球根。