


問：爲什麼每年5～6月間栽植絲瓜所開的雌花，著生較少？（九如／陳金塔農友）

答：絲瓜品種有長日照和短日照之分，而晚春或初夏日照較長，如種植短日照品種，在該季節就不容易開花結果，因此宜改種長日照品種或對日照不敏感的品種，絲瓜雌花著生就會比較多。（楊文振答）

問：夜來香產期多集中於夏季及早秋所生產之切花品質不佳，且售價不高，若能將花期調節至冬季，則花價較高。請問夜來香如何進行花期調節至冬季？（萬丹／李國文農友）

答：夜來香冬季生產之切花品質較佳，瓶插壽命長。若要將花期調節至冬季，首先將種球收穫後乾燥，然後以5-10℃低溫貯藏，貯藏至欲種植日期前一天。貯藏球自種植到開花所需的時間依種植期而異，以10月種植爲例，約經105～115天左右即可開花採收。（許哲夫答）



問：新鐵炮百合發芽後約3-5公分時，新葉及種球有腐爛的現象，是何原因？（鹽埔　呂見能農友）

答：拿回實驗室，經培養後鏡檢，是Fusarium(臙胞菌)及Rhizoctonia病，所造成的腐爛現象。建議利用25%撲克拉EC2000～2500倍，或50%福多寧WP2500～3000倍，噴灑葉部及灌頭處理，且注意田間衛生，如有發現此種病害時，應馬上拔除及挖起附近土壤，以免因灌水擴散，造成大面積感染。（陳明昭答）

問：唐菖蒲種球有腐爛現象，而晚香玉（夜來香）葉片上有許多葉蟎，請問如何防治？(竹田／蔡盛松農友)





答：經