

晚香玉折痕處受葉蟎危害情形

答：經實驗室鏡檢後，唐菖蒲種球上有許多根蟎，建議在種植前或貯藏（進入冷藏庫）前，利用25%新殺蟎EC4000倍、或20%西脫蟎EC2000倍，浸漬種球30分鐘處理，防治根蟎，避免繁殖。故在購買種球時，應避免購入有根蟎的種球，且最好與水稻輪作。晚香玉（夜來香）葉片在折痕處，有許多葉蟎(紅蜘蛛），



新鐵炮百合罹病腐爛現象

建議可利用2%阿巴汀EC2000倍、或5%芬普蟎EC1000倍噴灑防治。（陳明昭答）

問：蓮霧催化前20天及40天，各以10 PPM2.4-D噴灑全株葉面催化效果良好，但以後果實發育不良，品質差，應如何改善？(林邊／藍韓鋒農友)

答：2.44-D爲一種植物生長調節劑，但濃度高時卻變成一種殺草劑，容易發生藥害，以致抑制蓮霧正常生理作用，因此果實發育不良，品質變劣。目前提早開花調節產期方法很多，建議藍班長任採用下列一種催花較妥：

1. 控制氮肥：僅施磷、鉀肥及微量元素即可，宜待催花成功後才施氮肥。
2. 浸水處理：於七月上、中旬全園浸水1～2個月。
3. 斷根處理：催花前14天樹冠內緣約40～60公分處，切斷部份根。
4. 樹幹基部環狀剝皮或敲打：催花前1～2個月行環剝1～2公分寬或用鐵器敲打成傷。
5. 遮蔭處理：用90%防紫外線黑色遮光網，覆蓋樹冠約28天，催花率高達80%以上，頗爲穩定。

(鍾德月答)