



新聞資料

行政院農業委員會臺東區農業改良場

臺東縣臺東市中華路一段 675 號

中華民國 102 年 9 月 26 日

協助農友颱風災後復育，臺東場舉辦「水稻品種特性、合理化施肥技術講習暨與民有約座談會」

為協助農友颱風災後復育，降低災後病蟲害發生及農友損失，推廣水稻新品種及合理化施肥技術，行政院農業委員會臺東區農業改良場（以下簡稱臺東場）於本（102）年 9 月 26 日上午 10 時，假池上鄉農會超市二樓農民教室舉辦「水稻品種特性、合理化施肥技術講習暨與民有約座談會」，池上地區百餘位農友與會，池上鄉農會黃榮欄亦列席參加，與會農友提問熱烈並互相交換栽培管理心得，咸認收穫豐富。

臺東場場長林學詩指出，水稻在強風豪雨侵襲下，容易造成作物葉片破損影響生長；而在颱風過境天氣放晴後，導致田間環境高溫多濕，易使病害蔓延，提醒農友需提早因應氣候變化所衍生的栽培管理問題及採取預防措施，並隨時注意臺東場發布之病蟲害警報，掌握最佳防治時機。

講習會首先由林家玉助理研究員說明水稻品種特性及颱風後田間管理措施，提醒農友清除田間吹落的樹枝、樹葉及垃圾，避免影響水稻生育；目前水稻正值孕穗期至抽穗期，必須注意水分管理，稻田如有淹沒應盡速排水，但如果水利設施受損供水困難，建議可留存部分積水，供水稻生育之用。在土壤肥料方面，廖勁穎助理研究員建議農友視水稻生育情形，合理化施用穗肥，尤其氮肥施用與病害發生有關，過量施用反而造成發病嚴重。

蔡恕仁課長說明風災後水稻病蟲害防治技術，尤其白葉枯病及稻熱病的防治，白葉枯病的特徵在葉片邊緣形成波浪狀黃色條紋病斑，隨著葉脈往下蔓延；主要的感染方式為葉片互相摩擦經由傷口傳染，而在颱風過後葉片破損及降雨都有利病害蔓延，病害發生嚴重時會造成減產並降低稻米品質，田間發病時應立即採取防治工作。防治上注意在露水未乾前，避免進入田區以減少傳播。可選擇下列藥劑使用：

1. 10%克枯爛可濕性粉劑 1,000 倍。

2. 6%撲殺熱粒劑每公頃 30 公斤。
3. 14%嘉賜克枯爛可濕性粉劑 1,500 倍。
4. 10%鏈四環黴素水溶性粉劑 1,000 倍。
5. 33%克枯三賽唑可濕性粉劑 1,000 倍。

在穗稻熱病的管理上，以孕穗期至抽穗期的防治效果最佳，也提醒農友必須使用符合規定的登記藥劑，以免個人違法受罰，連帶影響產業形象。



林學詩場長主持池上「水稻品種特性、合理化施肥技術講習暨與民有約座談會」。



蔡恕仁課長說明颱風過後病蟲害管理措施，提醒農友對症下藥，精準防治。



林家玉助理研究員說明水稻品種特性，並請農友注意颱風後田間復育管理措施。



颱風危害造成水稻葉片破損，傷口易感染病害。



水稻白葉枯病危害情形。

聯絡人：臺東區農業改良場作物環境課助理研究員 廖勁穎
電 話：089-325110#721

手 機：0958-692990

☒	是	☐	否	是否張貼於本場網頁
-------------------------------------	---	--------------------------	---	-----------