



小黃腹鼠：俗稱大卵哥仔，頭及軀幹長104~177mm。體背部深褐色，體側色較淡，腹部則為灰白色，背腹間分界明顯，最大特徵乃具巨型睪丸突出於股外末端。食性以甘薯、花生、稻等為主。7~10月發生最盛期，胎數約4~6隻。

鬼鼠：俗稱大山和，頭及軀幹長207~280mm，體格粗壯，四肢強大。體背面暗褐色，腹面則淺色或淺褐色，背腹間無界線，四肢污褐色，尾灰褐色，全身密佈劍毛，食性極為複雜，常出現於豬舍，主要棲息於耕地區，尤常蔗作地區。在4~11月為發生盛期，一生可繁殖6~9次，每次胎數為3~8隻。

溝鼠：俗稱白腹仔，頭及軀幹長190mm，身體背部淡灰褐色，有些黃色，中央線部顏色較暗，腹部為灰白色，背部之間界線明顯，四肢淺白色。食物有豆科農作物、玉米、稻穀、馬鈴薯、昆蟲體、獸毛、魚鱗。棲所多半在住家附近。一年可生殖數次，每胎為4~12隻。

赤背條鼠：體小形，尾常較體略長，毛質柔軟，背面正中有一明顯之黑色縱條。多棲息於雜作田、甘薯田及豆田中，秋冬二季密度較高。

田鼴鼠：俗稱月鼠，體型最小。尾常較體略長，耳大，體毛柔軟，背腹之界顯明，尾上部淡褐色，下部灰白色，二者界線明顯。其活動範圍多半於蔗田、雜作田如甘薯田中密度極高，秋春二季發生較多。

防除方法

1. 整理環境：清除雜物破爛，整理庭園，物品堆置整齊，與牆壁保持距離或墊高30公分放置，拆除損壞之天花板、夾牆及地板，杜絕鼠隻窩藏營巢。
2. 斷絕鼠糧：收藏收物，清運垃圾，貯存米穀、麵粉、雜糧等於密閉之容器或倉庫，廚房內食物應收存於櫥櫃、冰箱內，垃圾桶加蓋，禽畜食剩飼料應每日清掃收拾乾淨，水溝保持暢通。清潔隊增加垃圾清運次數，減少鼠隻覓食及食物被污染。
3. 防鼠設備：修整房屋，封閉鼠穴、鼠道，管路或陰溝加設阻隔網，房舍應有阻隔鼠隻進出通道之設施。
4. 捕殺方法：可放粘板於鼠隻通道粘捕，也可用鼠籠、鼠夾及鼠剪捕殺，或以貓、犬等天敵捕殺。自然界蛇、鷹亦有相當之抑制功能，也有用灌水、煙燻追擊撲殺者。
5. 毒餌誘殺：藥劑毒殺可分速殺劑及緩效性毒殺劑兩種，目前推廣之餌劑為抗凝血酵素劑類，破壞維生素K，使微血管末梢破裂出血，無法凝固而致死，同時會因口渴而至水邊。中毒安靜不驚擾其他鼠隻，是最好最安全的緩和性殺鼠劑，可惜住家及商店戶均不重視，致防治效果不佳。

老鼠適應性強，繁殖快，食料廣，天敵因人為破壞而減少，陰蔽棲身場所又多，故每年一次的固定防除週是不夠的，平時即要注意捕殺，方能達到防除效果。