茄子 優良品種及栽培改進

◆戴順發・陳東鐘◆



茄子支柱栽培

台灣位處亞熱帶及熱帶，氣候高溫多濕，極適茄子之生長，農民栽培歷史已久。地方品種原本繁多，近年來在經濟栽培的考量下逐漸被淘汰，目前鮮銷用栽培品種高屏地區以屏東長茄，中部彰化一帶以麻芝茄爲主。茲將兩主要栽培品種之特性介紹如下：

屏東長茄：株形半直立，枝幹粗，葉片厚而大，花紫紅色，果形長直，果色亮紫，果底圓，果長一般在30～35公分之間，若栽培管理良好，秋冬季及早春最大果長可達40～45公分。

豐產，遇逆境恢復力強，耐寒但不耐熱，夏季生產之果實色澤淡，且果長變短。南部地區最早於 5～6月播種，7～8月定植，9月起即可陸續採收茄果至次年 4月止，採收期長達10個月份。產銷方面除9月搶早市者價格較高外，1～3 月爲高屏地區之黃金產期，品質優，價格亦平穩。

麻芝茄：株形直立，枝幹較細，葉片薄而稍小，花紫紅色，果形細長，尾端稍彎曲，果色亮紫，果底尖，果色亮黑紫，果長一般亦在30～35公分之間，若栽培管理良好，夏季最大果長可達40～60公分。

豐產，遇逆境恢復力弱，耐熱但不耐寒，冬季寒流來襲時果實易蜷曲變形，且不易著果。中部地區栽培時期多於10～11月播種，翌年1～2月定植， 5月開始採收至10月爲止。

採收期約爲5～6個月，若當年爲暖冬則採收期可延長至12月。少部分於 3月播種， 4月定植， 6月份開始採收至年底。中部地區茄果品質較佳之月份爲5～8月。

施肥：茄子生育期長，肥料需要量也多，一般土壤的肥料用量如下表：

茄子施肥量　（公斤/0.1公頃）

肥料種類	基肥	追肥
雞糞堆肥	2000	—
豆餅	100	—
硫酸銨	40	15
過磷酸鈣	120	20
氯化鉀	20	5

高雄區農業改良場旗南分場助理研究員(07)6622274