



薑荷花

生長習性與栽培管理

◆許玉妹◆

薑荷花屬於薑科薑荷屬，原產於泰國清邁一帶，約在民國78年間由業者輾轉自泰國引進。由於粉紅色的苞片酷似荷花，且為薑科，業者稱其為薑荷花，而一直沿用至今。

薑荷花的花期約在6月初至10月上旬，正值本省夏季切花種類少、產量低的時期，正可彌補本省夏季切花之不足，故近一、二年來成為夏季切花的新寵。因其花形像荷花，花色又討喜，常被用作為敬神禮佛的花卉，所以每逢農曆初一、十五，市場需求量明顯增加。

目前栽培地區散佈在中南部，如台中豐原、南投草屯、彰化田尾、嘉義港坪、及屏東縣的鹽埔鄉、九如鄉、內埔鄉等地均有零星栽培。高雄區農業改良場近年來致力於薑荷花休眠性探討，及種球生產技術之研究改良，並引進多種薑荷屬植物，進行特性觀察和適應性評估。

植株性狀及生長習性

薑荷花是多年生草本熱帶球根花卉，種球由圓球狀至圓錐狀之球莖（或稱根莖），及著生於球莖下半部的圓球狀的貯藏根（或稱營養根）組成。本省南部約在2月下旬至4月上旬種植，種植後先

由貯藏根底部長出鬚根狀的吸收根，隨後球莖上之芽體萌芽；新芽先向下再彎向上生長，並在新芽基部長出新的根群。球莖萌芽時可能萌一至二芽，但通常僅有一芽抽出新葉。萌芽後2-4片葉展開時，莖頂抽出花蕾，隨後花芽發育，花梗抽長並開花。花序為穗狀花序，主要觀賞的部位為花序上半部粉紅色的苞片；真正的小花著生在花序下半部綠色苞片內。

薑荷花從春季種植至秋末冬初進入休眼前，當年內可萌生數代新芽。通常當第一代芽花蕾形成時，第二代芽已自第一代芽基部萌發，然後又自第二代芽基部萌發第三代芽，……順序繁衍下去，生育狀況良好的植株當年就可以繁衍4-6代。

新芽在頂芽花芽分化抽芽開花的同時，莖的基部肥大形成新的球莖。一般而言，每萌一個芽就可以生成一個球莖，平均一個母球莖種植一年約可繁殖5



薑荷花的種球由球莖及貯藏根組成