

豌豆病蟲害安全用藥資訊


林大淵　趙佳鴻　王妃蟬　沈原民　劉興隆

(豌豆病蟲害用藥依據植物保護手冊網路版 102 年 7 月整理)

作用對象	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期 (天)	備註
白粉病	碳酸氫鉀	80% 水溶性粉劑 1000 倍	–	
	礦物油	99% 乳劑 500 倍	–	
	枯草桿菌	50% 可濕性粉劑 800 倍	–	避免與銅劑或抗生素混合使用
	待克利	24.9% 乳劑 3000 倍 24.9% 水懸劑 3000 倍 250g/L 乳劑 3000 倍 10% 水分散性粒劑 1200 倍	3	
	三泰隆	5% 可濕性粉劑 2000 倍	3	
	平克座	10.5% 乳劑 4000 倍	6	
	三得芬	84.2% 乳劑 3500 倍	9	
	白克列	50% 水分散性粒劑 2500 倍	9	
	撲滅寧	50% 可濕性粉劑 1200 倍	14	
灰黴病	賽普護汰寧	62.5% 水分散性粒劑 2000 倍	14	
	派美尼	37.4% 水懸劑 1500 倍	14	
露菌病	松香酯酮	48% 乳劑 1000 倍	–	
	亞托敏	23% 水懸劑 2000 倍	14	
立枯病	脫克松	50% 可濕性粉劑 每公斤種子拌 0.5 公克藥劑	–	種子拌藥後種植
疫病	依得利	35% 可濕性粉劑 3000 倍 25% 乳劑 1500 倍	–	限苗期使用，均勻澆灌於苗床土壤；提高濃度易藥害
	亞托敏	23% 水懸劑 1000 倍	14	
白絹病	撲滅寧	50% 可濕性粉劑 2000 倍	14	
銹病	白列克敏	38% 水分散性粒劑 1500 倍	9	



作用對象	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期(天)	備註
薊馬類	賽洛寧	2.46% 膠囊懸著液 1000 倍 2.5% 微乳劑 1000 倍 2.8% 乳劑 1000 倍	3	
	畢芬寧	2.8% 乳劑 1000 倍 2.5% 水懸劑 1000 倍	3	
	賜諾殺	2.5% 水懸劑 1000 倍	3	
	亞滅培	20% 水溶性粉劑 4000 倍	6	
	福化利	25% 乳劑 3000 倍	7	
	貝他賽扶寧	2.9% 乳劑 1500 倍	9	
	益達胺	9.6% 溶液 2000 倍 9.6% 水懸劑 2000 倍	9	
	佈飛松	43% 乳劑 800 倍	10	
潛蠅類	賽滅淨	8.9% 溶液 1000 倍 75% 可濕性粉劑 6000 倍	7	
豆莢螟	加保利	50% 可濕性粉劑 1000 倍 85% 可濕性粉劑 1700 倍	7	
夜蛾類及毒蛾類	核多角體病毒	2x109OBs/mL 水懸劑 3000 倍	—	
	賽洛寧	2.46% 膠囊懸著液 2000 倍 2.5% 微乳劑 2000 倍 2.8% 乳劑 2000 倍	3	
	馬拉松	50% 乳劑 500 倍	4	不可與鹼性藥劑混用
	賽速安勃	40% 水分散性粒劑 5000 倍 300g/L 水懸劑 4000 倍	6	
	陶斯松	44.9% 乳劑 1000 倍	16	
	克凡派	10% 水懸劑 1000 倍	18	
豆類赤葉蟎	大克蟎	18.5% 可濕性粉劑 500 倍 35% 可濕性粉劑 950 倍	—	
	芬佈克蟎	35% 可濕性粉劑 500 倍	7	
粉蝨類	益達胺	9.6% 溶液 1500 倍 9.6% 水懸劑 1500 倍	9	
		28.8% 溶液 4500 倍	21	
	達特南	20% 水溶性粒劑 3000 倍	9	
	派滅淨	25% 可濕性粉劑 2000 倍	21	
蚜蟲類	畢芬寧	2.8% 乳劑 1000 倍 2.5% 水懸劑 1000 倍	3	



作用對象	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期（天）	備註
葉用豌豆延伸使用藥劑	銅右滅達樂	71.6% 可濕性粉劑 600 倍	3	葉用豌豆露菌病
	達滅芬	50% 水懸劑 3000 倍 50% 可濕性粉劑 3000 倍	6	葉用豌豆露菌病
	氟比拔克	60.8% 水懸劑 1500 倍	6	葉用豌豆露菌病
	達滅克敏	18.7% 水分散性粒劑 1500 倍	9	葉用豌豆露菌病
	普拔克	39.5% 溶液 250 倍 66.5% 溶液 400 倍	6	葉用豌豆疫病
	派美尼	37.4% 水懸劑 1500 倍	7	豆科豆菜類灰黴病
	賽普護汰寧	62.5% 水分散性粒劑 2000 倍	14	豆科豆菜類灰黴病
	百滅寧	10% 可濕性粉劑 1000 倍 10% 乳劑 1000 倍 10% 水基乳劑 1000 倍	4	葉用豌豆葉部薊馬類
	賜諾殺	2.5% 水懸劑 1000 倍	6	葉用豌豆葉部薊馬類
	密滅汀	1% 乳劑 1500 倍	6	葉用豌豆葉蟎類
	畢達本	20% 可濕性粉劑 3000 倍	14	葉用豌豆葉蟎類
	阿巴汀	2% 乳劑 1000 倍	15	葉用豌豆潛蠅類
	賽速安勃	40% 水分散性粒劑 5000 倍 300g/L 水懸劑 4000 倍	9	
	陶斯松	44.9% 乳劑 1000 倍	10	
	克凡派	10% 水懸劑 1000 倍	10	
豌豆園雜草	巴拉刈	24% 溶液 150 倍	—	播種覆土後使用
	施得圃	34% 乳劑 150 倍	—	播種覆土後使用

病蟲害診斷服務或用藥諮詢請電洽台中區農業改良場植物保護研究室 04-8523101 分機 320、321



農藥稀釋倍數對照表

下表爲藥劑常用稀釋倍數對照，表內數值代表藥劑 公克數或 cc 數

用水量	農藥稀釋倍數										
	400倍	500倍	800倍	1000倍	1500倍	2000倍	2500倍	3000倍	3500倍	4000倍	6000倍
16公升	40	32	20	16	10.7	8	6.4	5.3	4.6	4	2.7
20公升	50	40	25	20	13.3	10	8	6.7	5.7	5	3.3
25公升	62.5	50	31.3	25	16.6	12.5	10	8.3	7.1	6.3	4.2
120公升	300	240	150	120	80	60	48	40	34.3	30	20
200公升	500	400	250	200	133	100	80	66.7	57.1	50	33.3

