表一、本田期氮、磷、鉀三要素推薦用量如下：

1. 氮素（公斤／公頃）

<table>
<tr><th colspan="2">期 作 別</th><th>備　　註</th></tr>
<tr><td>一期作</td><td>二期作</td><td rowspan="2">1. 漏水田一、二期作分別為 170 和 160 公斤／公頃。
2. 一期作強酸性土壤減施 20 公斤／公頃，石灰性土壤增施 20-40 公斤／公頃。</td></tr>
<tr><td>120</td><td>100</td></tr>
</table>

2. 磷酐（公斤／公頃）

根據土壤肥力分析結果磷酐推薦如下表：

土壤有效性磷		磷酐（公斤／公頃）	
含量（mg/kg）	等級	一期作	二期作
＜ 1.6	極低	70-80	50-60
1.7-5.0	低	60-70	40-50
5.1-12.0	中	40-60	30-40
12.1-30.0	高	20-40	20-30
＞ 30.0	極高	0-30	0-20

3. 氧化鉀（公斤／公頃）

根據土壤肥力分析結果氧化鉀推薦如下表：

土壤有效性		氧化鉀*（公斤／公頃）		備 註
含量（mg/kg）	等級	一期作	二期作	排水不良土壤按推薦量增施30公斤／公頃。
＜ 15	極低	60-70	80-90	
16-30	低	50-60	60-80	
31-50	中	30-50	40-60	
＞ 50	高	0-30	0-40	

表二、本田期氮、磷、鉀三要素施用方法

三要素	施肥期			
	基肥	插秧後一期15天、二期10天	插秧後一期30天、二期20天	幼穗形成期
氮肥	30%	20%	30%	20%
磷肥	100%	—	—	—
鉀肥	20%	30%	30%	20%