



Part 4

咖啡病蟲害發生及非農藥防治技術

Diseases Of Coffee Pests & Non-Pesticide Control techniques

13

咖啡病蟲害發生及非農藥防治技術

本場於99-101年間調查臺東地區多處咖啡園，田間種植情形多為密植，成株後植株枝葉茂密，若未經妥善修剪枝條，容易造成通風不良，進而導致病蟲害發生。



茲將調查結果臚列如下：

一、病害 | 常見的有銹病、炭疽病、褐眼病、葉斑病、果實細菌性病、苗立枯病及粉介殼蟲引起之煤煙病等（圖17~23）。其中以褐眼病及炭疽病最常發生，銹病次之，為咖啡園中的三大主要病害。



17

圖片
解說

銹病



18

炭疽病



19

褐眼病



20

葉斑病



21

果實細菌性病害



22

苗立枯病



23

煤煙病

二、蟲害 | 常見的有介殼蟲類、東方果實蠅、咖啡木蠹蛾、潛葉蠅及椿象等（圖24~28）。蟲害在咖啡園多屬偶發性、季節性或局部性，其造成之經濟損失不如病害嚴重。但若任其在田間建立棲群，仍可能造成經濟損失。故應密切注意田間害蟲發生情形，必要時進行植株修剪或防治作業，以降低害蟲密度。



24

圖片
解說

介殼蟲



25

東方果實蠅



26

咖啡木蠹蛾



27

潛葉蠅



28

椿象