

小心顏色鮮豔的臭屁蟲 荔枝椿象

文·圖／陳明吟
曾敏南



成蟲體背呈褐色
腹部為白色

荔枝椿象，喜好棲息在荔枝、龍眼或欖樹等無患子科植物上；受驚擾時，常射出具腐蝕性臭液來自衛，如果觸及人體皮膚或眼睛會造成灼傷般的潰爛，相當疼痛。由於此蟲是1種新興害蟲，大多數民眾對他並不認識，因此疏於防範。本場籲請民眾應認識此蟲外觀並注意防範，切忌徒手抓蟲，且要小心他自樹上掉落時不慎接觸，以避免對人體造成傷害。

荔枝椿象為半翅目、荔椿科害蟲，俗稱臭屁蟲、臭椿象或荔椿等。1年可發生1世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲等3個時期。荔枝椿象喜好棲息在荔枝及龍眼等無患子科植物的樹冠嫩葉叢中。2~5齡若蟲體型為長方形，呈橙紅色至淡橙色，外圍具有黑色框線；成蟲期腹面為白色，背面呈褐色。受干擾時有假死行為，同時分泌臭液，並掉落於地，但很快又往樹上爬。由於荔枝及龍眼常見於居家庭院中，有時也做為鄉間小路的行道樹，因此，民眾有機會在居家附近接觸到此蟲。近來有民眾因為捕捉顏色鮮豔的

若蟲把玩，被其分泌的臭液灼傷手掌，也有民眾接觸到從龍眼樹上掉落的荔枝椿象，以致於胸口及腹部等多處皮膚潰爛，疼痛不堪。

荔枝椿象的若蟲及成蟲也是荔枝與龍眼的重大害蟲。可刺吸荔枝與龍眼的嫩梢、花穗及幼果，導致落花、落果或果皮黑化等，對其產量影響甚大，因此需注意防範。在荔枝栽培園區中若發現荔枝椿象，可選用核准用藥例如50%芬殺松乳劑、2.4%第滅寧水懸劑或40.64%加保扶水懸劑等來進行防治。此外，由於冬季低溫時，其成蟲活動力較差，可搖動或敲打枝葉使成蟲掉落後再予以捕殺；但捕殺時，切勿徒手直接接觸，且敲打植株時應避免蟲體落下接觸身體。此外，也可於主幹基部塗布黏膠，除可防止掉落的若蟲爬回樹上危害外，若蟲會因被黏膠黏住而死亡。農友在鑑定或防治上如有進一步問題，歡迎逕洽本場，技術人員將竭誠為農友服務。



荔枝椿象初孵化若蟲



若蟲體型為長方形，呈橙紅色至淡橙色。



民眾不慎接觸荔枝椿象後，造成皮膚潰爛。