表一、巴克素不同處理時期及濃度對蝴蝶蘭 *Phal.* Nobby's Amy 花序長度之影響

Table 1. Effects of paclobutrazol treatments on inflorescences length of *Phal.* Nobby's Amy.

巴克素處理方式		花序長度 (cm)		
處理時期	處理濃度 ($mL \cdot L^{-1}$)	花序總長	第一朵花以下花序長	第一朵花以上花序長
對照組	0	48.3 a [z]	34.6 a	14.8 a
抽梗前	0.25	43.1 ab	30.0 ab	12.6 bc
抽梗前	0.5	43.0 ab	29.7 ab	13.0 abc
抽梗前	1.0	41.6 bc	28.7 bc	12.9 abc
抽梗後	0.25	48.0 a	32.9 ab	14.9 a
抽梗後	0.5	44.2 ab	29.1 bc	14.3 ab
抽梗後	1.0	36.5 cd	21.5 d	13.1 abc
抽梗前+抽梗後	0.25	34.5 de	24.0 cd	12.6 bc
抽梗前+抽梗後	0.5	29.8 ef	19.5 d	11.5 c
抽梗前+抽梗後	1.0	28.8 f	13.9 e	13.4 abc
Significance				
處理時期 (A)		***	***	**
處理濃度 (C)		***	***	*
A × C		**	**	NS

[z] Mean separation within columns by LSD at $P < 0.05$ level.

NS, *, **, *** Non-significant or significant at $P < 0.05$, 0.01, and 0.001, respectively.