表三、巴克素不同處理時期及濃度對蝴蝶蘭 *Phal.* Sogo Kitty 開花表現之影響
Table 3. Effects of paclobutrazol treatments on flowering performance of *Phal.* Sogo Kitty.

巴克素處理方式	梗數	花朵數	花徑 (cm)	花序長 (cm)	新葉長 (cm)
對照組	1.1±0.2 [z]	22.9±2.9	5.6±0.0	68.7±1.3	20.4±0.4
抽梗前 0.25 mL·L^{-1}	1.6±0.1	27.3±1.5	5.7±0.1	49.3±3.7	14.7±1.7
抽梗前 0.125 mL·L^{-1}	1.8±0.2	27.9±0.5	5.6±0.0	51.2±0.3	15.0±1.9
抽梗後 0.5 mL·L^{-1}	1.3±0.3	28.6±2.2	5.7±0.1	55.3±2.6	16.6±2.2
抽梗後 0.25 mL·L^{-1}	1.3±0.2	26.4±1.4	5.6±0.1	57.1±2.7	18.1±1.9
抽梗後 0.125 mL·L^{-1}	1.2±0.2	23.0±2.6	5.6±0.1	58.1±1.5	18.3±1.1

[z] The data represent means ± S.E.



圖四、巴克素處理後 *Phal.* Sogo Kitty 花序長度比例較佳(左)

Fig. 4. *Phal.* Sogo Kitty had a better ratio of inflorescences length after paclobutrazol treatments (left).