表二、巴克素不同處理時期及濃度對蝴蝶蘭 *Phal.* Nobby's Amy 開花表現之影響

Table 2. Effects of paclobutrazol treatments on flowering performance of *Phal.* Nobby's Amy.

巴克素處理方式		開花表現		
處理時期	處理濃度 ($mL \cdot L^{-1}$)	花朵數	花徑 (cm)	花梗數
對照組	0	12.5 ab [z]	6.7 b	1.2 a
抽梗前	0.25	11.0 ab	6.8 ab	1.0 a
抽梗前	0.5	11.6 ab	6.8 ab	1.2 a
抽梗前	1.0	9.3 b	6.9 a	1.2 a
抽梗後	0.25	13.3 ab	6.8 ab	1.0 a
抽梗後	0.5	11.7 ab	6.7 b	1.0 a
抽梗後	1.0	11.5 ab	6.8 ab	1.2 a
抽梗前+抽梗後	0.25	10.7 ab	6.8 ab	1.0 a
抽梗前+抽梗後	0.5	9.8 ab	6.9 a	1.0 a
抽梗前+抽梗後	1.0	13.5 a	6.9 a	1.0 a
Significance				
處理時期 (A)		NS	*	NS
處理濃度 (C)		NS	NS	NS
A × C		NS	NS	NS

[z] Mean separation within columns by LSD at $P < 0.05$ level.

[NS],[*] Non-significant or significant at $P < 0.05$ respectively.