

雨季來臨

請農友注意防範荔枝露疫病發生

文·圖／陳泰元

目前已進入梅雨季節，且荔枝正值結果期，極易遭受荔枝露疫病危害，為有效掌握病害防治最適時機，本場特別籲請農友加強注意荔枝露疫病的發生，及時採取防治措施，選用政府核准使用的藥劑並確實做好果園衛生管理工作，以確保荔枝品質及產量。

荔枝露疫病俗稱水傷、水霉病，除了新葉、花穗、幼果及成熟期果實會被感染外，在採後運輸的過程中果實也會遭受感染。當遇連續降雨約一星期後，靠近地面的果實會開始陸續出現病斑，初期呈現綠色或綠褐色斑點，1~2天後果皮表面會長出白色霜粉狀物，罹病果實極易腐敗造成嚴重落果。在運輸過程中，因為包裝箱內濕度較高，如有罹病果實或尚未發病的染病果實參雜其中，則開箱後可見整把果實或整箱果實全數腐敗。



荔枝果實罹患露疫病，果皮表面長出白色霜粉狀物。

防治荔枝露疫病一定要先做好清除罹病枝葉及果實等果園衛生管理工作，並改善果園通風及日照，降低果園濕度，再選用 80% 福賽快得寧可濕性粉劑、55% 腈硫醃銅可濕性粉劑、72% 鋅錳克絕可濕性粉劑、33.5% 快得寧水懸劑、33% 鋅錳乃浦水懸劑等植物保護手冊上的政府核准使用藥劑，並依其推薦施用方式使用；而在預防上，仍以非農藥資材—「亞磷酸」混合「氫氧化鉀」為最佳。本場已同時將輸日荔枝病蟲害防治用農藥參考基準置放於本場網站植物保護資訊項下荔枝病害用藥中 (http://kdais.coa.gov.tw/htmlarea_file/web_articles/kdais/4025/leechi-2.pdf) 供查詢，農友如在防治或用藥上仍有疑問，請逕洽 08-7389060，本場研究人員將竭誠提供服務。