

請加強荔枝花果管理 以減少損失

文・圖／李雪如



玉荷包帶葉花穗
(俗稱紅花)

友妥善管理花穗及幼果，以確保著果及果實品質。

荔枝是高屏地區重要果樹，尤其高雄市更是以早熟、質優的‘玉荷包’聞名。每年在11月之後，枝葉隨著氣溫下降及土壤乾燥，停止營養生長，孕育花芽，隔年春季開花。受去(104)年

受去(104)年暖冬及頻繁降雨影響，荔枝生育週期也亂了。往年，高雄市大樹區通往嶺口、旗山(台21線)沿路兩旁的‘玉荷包’荔枝，此時正是花海繽紛，農友忙碌剪花的時刻；

而今，花期不但延後，且多半為帶葉花穗(俗稱紅花)，本場特別籲請農

暖冬及偶發雨水影響，荔枝間歇性抽梢頻率增加，原本不及4成的抽穗率，經過這波超強寒流及幾次低溫後，讓部分生長停頓的枝條再現花芽，但所萌發的花穗多半為帶葉花穗，葉片的多寡會因氣候、栽培管理及晚梢控制技術而異。目前正是‘玉荷包’花穗發育及果粒即將形成的時候，請農友妥善疏花並加強水分及肥培管理，以確保著果及果實正常發育。



玉荷包始花期應疏剪花穗提高著果

‘玉荷包’荔枝原是大花穗、小花數量多的品種，但今年可能會因抽穗較晚及帶葉花穗多，花穗長度明顯較短，當花穗上葉片數多時需減少葉片量，以利花穗正常生長發育，並依花穗生長情形，適量施用氮、磷、鉀(1:1:1 或 1:2:2)複合肥料及補充鈣肥及硼等微量元素，再適期適量地疏剪花穗。這期間，氣溫仍變化大，且偶有降雨，因此，應充分利用授粉昆蟲(蜜蜂)，增加授粉機會，提高著果；在盛花期須審慎使用營養劑或植株生長素，避免花器受傷而著果不良；當果實開始綠化膨大(約母花開後2週)，採漸進式由少漸多，均衡供應水分，保持土壤濕潤，除可防止落果，也能促進果實正常發育，同時減少土壤水分乾濕變化過大，而發生嚴重裂果。

近年來，氣候變化越來越捉摸不定，栽培一年1收的常綠果樹，對農友的考驗更加嚴峻。玉荷包生產模式雖多已建立，但面臨氣候變化無常時，只有充分了解栽培品種特性，配合良善的管理技術，才能緩和氣候劇烈變化的衝擊。

