附件二、花胡瓜病蟲害防治用藥一覽表

(依植物保護手冊 105 年 3 月 10 日網路版整理)

病蟲害名稱	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期 (天)	作用機制代號
露菌病	鹼氯氫氧銅	34% 水懸劑 600 倍	0	mc1
	四氯托敏 *	560g/L 水懸劑 1,000 倍	7(設施 13)	mc5+C3
	達滅克絕	35% 可濕性粉劑 1,500 倍	6(設施 12)	H5+un01
	安美速	17.7% 水懸劑 4,000 倍	3(設施 9)	C4
	鋅錳座賽胺	75% 水分散性粒劑 1,000 倍	3	mc3+B3
	枯草桿菌	50% 可濕性粉劑 800 倍	0	F6
	賽座滅	9.4% 水懸劑 3,000 倍	3	C4
	亞托敏	23% 水懸劑 2,000 倍	6	C3
	甲鋅毆殺斯	64% 可濕性粉劑 400 倍	6	mc3+A1
	四氯賽得	70% 可濕性粉劑 800 倍	6	mc5+un02
	四氯異苯腈	75% 可濕性粉劑 500 倍	7	mc5
	四氯異苯腈	75% 水分散性粒劑 500 倍	7	mc5
	四氯異苯腈 *	40% 水懸劑 1,000 倍	7	mc5
	錳乃浦	80% 可濕性粉劑 400 倍	7	mc3
	硫酸快得寧	39% 可濕性粉劑 400 倍	4	mc1
	鋅錳右滅達樂	53% 水分散性粒劑 400 倍	7	mc3+A1
	鋅錳滅達樂	58% 可濕性粉劑 400 倍	7	mc3+A1
	波爾多 *	72% 可濕性粉劑 400 倍	3	mc1
	福賽快得寧 *	80% 可濕性粉劑 1,500 倍	9	un02+mc1
	達滅芬 *	50% 可濕性粉劑 3,000 倍	6	H5
	快得寧 *	80% 可濕性粉劑 1,500 倍	12	mc1
	快得滅達樂 *	54% 可濕性粉劑 400 倍	6	mc1+A1

病蟲害名稱	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期 (天)	作用機制代號
露菌病	普拔克 *	39.5% 溶液 400 倍	15	F4
	三元硫酸銅 *	27.12% 水懸劑 800 倍	3	mc1
	免得爛 *	80% 水分散性粒劑 500 倍	6	mc3
	氟比拔克	60.8% 水懸劑 1,500 倍	胡瓜 21(設施 27) ; 花胡瓜 6(設施 12)	B5+F4
	腈硫醌銅	55% 可濕性粉劑 500 倍	7	mc9+mc1
	嘉賜銅	77.5% 可濕性粉劑 1,000 倍		D3+mc1
	免得克絕	75% 可濕性粉劑 750 倍	3	mc3+un01
	曼普胺	250g/L 水懸劑 2,500 倍	6(設施 12)	H5
	達滅脫定	525g/L 水懸劑 1,000 倍	6	H5+C8
立枯病	殺紋寧	30% 溶液 1,000 倍	苗期使用	A3
炭疽病	四氯保淨	70% 可濕性粉劑 500 倍	6	mc5+B1
	腈硫醌 *	22.7% 水懸劑 700 倍	7	mc9
幼苗疫病	普拔克	66.5% 溶液 400 倍	苗期使用	F4
疫病	氟比拔克 *	60.8% 水懸劑 1,000 倍	胡瓜 21(設施 27) ; 花胡瓜 6(設施 12)	B5+F4
	蓋棘木黴菌	1×107cfu/g 可濕性粉劑 2,000 倍	0	
	免得克敏 *	60% 水分散性粒劑 800 倍	9	M3+C3
	右滅達樂	2.5% 粒劑 (定植前 20 公斤 / 公頃 · 定植後 40 公斤 / 公頃)	苗期使用	A1
	依得利	25% 乳劑 1,500 倍	6	F3
	依得利	35% 可濕性粉劑 2,000 倍	6	F3
	達滅芬	50% 可濕性粉劑 3,000 倍	6	H5
	達滅芬 *	50% 水懸劑 3,000 倍	6	H5

病蟲害名稱	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期 (天)	作用機制代號
白粉病	礦物油	99% 乳劑 500 倍	0	NC
	白克列	50% 水分散性粒劑 2,500 倍	6	C2
	碳酸氫鉀	80% 水溶性粉劑 1,000 倍	0	
	賽福座	30% 可濕性粉劑 3,000 倍	3	G1
	依瑞莫	25% 水懸劑 1,500 倍	7	A2
	布瑞莫	25% 乳劑 3,000 倍	3	A2
	布瑞莫	250g/L 乳劑 3,000 倍	3	A2
	芬瑞莫	11.76% 乳劑 10,000 倍	3	G1
	硫酸銅 *	21.4% 水懸劑 500 倍	6	mc1
	三得芬	84.2% 乳劑 3,500 倍	9	G2
	蟎離丹	25% 可濕性粉劑 1,000 倍	7	un
	賽福芬胺	18.4% 水分散性粒劑 2,000 倍	6	G1+un11
	平克座	10.5% 乳劑 3,000 倍	3	G1
	菲克利	5% 水懸劑 2,000 倍	14	G1
	邁克尼	13.4% 乳劑 4,000 倍	3	G1
	邁克尼	13.4% 水基乳劑 4,000 倍	3	G1
	三泰芬	5% 可濕性粉劑 2,000 倍	3	G1
蔓枯病	保粒黴素 (丁)*	11.3% 水分散性粒劑 2,000 倍	0	H4
	撲滅寧 *	50% 可濕性粉劑 2,000 倍	3	E3
	亞托敏 *	23% 水懸劑 4,000 倍	6	C3
	保粒保淨 *	47% 可濕性粉劑 1,000 倍	6	H4+B1
	甲基多保淨 *	3% 軟膏劑	6	B1

病蟲害名稱	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期 (天)	作用機制代號
細菌性斑點病	銅快得寧	40% 可濕性粉劑 500 倍	3	mc1
地下部線蟲類	毆殺滅 *	10% 粒劑 20-40 公斤 / 公頃	限種植前使用	1A
蚜蟲類 (棉蚜)	氟尼胺	10% 水分散性粒劑 4,000 倍	3	9C
	派滅淨	50% 水分散性粒劑 4,000 倍	6	9B
	派滅淨	25% 可濕性粉劑 2,000 倍	6	9B
粉蝨類 (銀葉粉蝨)	可尼丁	0.5% 粒劑 25-30 公斤 / 公頃	限植穴使用	4A
	可尼丁 *	16% 水溶性粒劑 3,000 倍	9	4A
	派滅淨 *	25% 可濕性粉劑 1,200 倍	6	9B
	益達胺 *	9.6% 溶液 1,500 倍	6	4A
	益達胺 *	9.6% 水懸劑 1,500 倍	6	4A
葉部薊馬類	亞滅培 *	20% 水溶性粉劑 4,000 倍	6	4A
	益達胺	9.6% 溶液 1,500 倍	6	4A
	益達胺	9.6% 水懸劑 1,500 倍	6	4A
	佈飛松 *	43% 乳劑 800 倍	10	1B
花胡瓜南黃薊馬	益達胺	9.6% 溶液 1,500 倍	6	4A
	益達胺	9.6% 水懸劑 1,500 倍	6	4A
薊馬類	賜諾殺 *	2.5% 水懸劑 1,000 倍	3	5
	賜諾殺 *	11.6% 水懸劑 4,500 倍	3	5
	賜諾殺 *	80% 可濕性粉劑 32,000 倍	3	5
	覆滅蠟 *	20% 水溶性粉劑 600 倍	7	1A

病蟲害名稱	藥劑名稱	劑型與倍數	安全採收期 (天)	作用機制代號
金花蟲類	佈飛松 *	43% 乳劑 1,000 倍	10	1B
葉蟎類 (二點葉蟎)	密滅汀	1% 乳劑 1,500 倍	3	6
	亞醌蟎 *	15% 水懸劑 1,500 倍	21	20B
細蟎類	芬普蟎 *	5% 水懸劑 2,000 倍	7	21A
夜蛾類	剋安勃 *	18.4% 水懸劑 2,500 倍	3	28
	剋安勃 *	35% 水分散性粒劑 5,000 倍	3	28
夜蛾類、植食性瓢蟲類	馬拉松 *	50% 馬拉松乳劑 500 倍	4	1B
黃守瓜	加保利	50% 可濕性粉劑 500-1,000 倍	7	1A
	加保利	85% 可濕性粉劑 850-1,700 倍	7	1A
瓜實蠅	賜諾殺	0.02% 濃餌劑 1 公升 / 公頃	誘餌劑使用	5
	克蠅香	85% 混合溶液 原液	誘餌劑使用	—
	克蠅	95% 溶液 原液	誘餌劑使用	—
	馬拉松	25% 可濕性粉劑 400 倍	7(加蛋白質水解物使用)	1B

1. 本表適用於花胡瓜，內容如有錯誤，均以農藥主管機關公告為準
   (「農藥資訊服務網」網站網址為 http://pesticide.baphiq.gov.tw)
   (「植物保護手冊」網路版網址為 http://www.tactri.gov.tw)
2. 如有安全用藥或病蟲害問題，請洽詢臺中區農業改良場植物保護研究室 04-8521493

* 延伸使用藥劑