

咖啡延伸使用藥劑公告

文/茶作課 林秀欒
(電話：03-4822059轉226)

依據行政院農業委員會動植物防疫檢疫局中華民國104年11月13日防檢三字第1041489196號函公告，咖啡藥劑延伸使用範圍包括咖啡炭疽病、咖啡軟介殼蟲、咖啡盾介殼蟲、咖啡粉介殼蟲及咖啡東方果實蠅等，藥劑使用資訊整理如表一及表二，請各位農友依照公告使用方法進行咖啡害物防治，仍需注意避免未核准登記使用藥劑的選用，及咖啡著果後應避免藥劑使用以降低農藥殘留疑慮，若有任何問題請洽茶改場及各分場站植物保護人員，電話與電子信箱如下，我們會儘快為各位解答。

1.總場：(03) 4822059或(03) 4823633
曾信光 tres552@ttes.gov.tw
林秀榮 tres226@ttes.gov.tw
寧方俞 nfy@ttes.gov.tw
2.文山分場：(02) 26651801
邱明賜 mizi@mail.wstres.gov.tw
3.魚池分場：(049) 2855128
許飛霜hsufs@ttes.gov.tw
4.台東分場：(089) 551446
余錦安taitung027@ttes.gov.tw
5.凍頂工作站：(049) 2753960
江正享 tds411@ttes.gov.tw

敬請就近諮詢，謝謝您。

表一、咖啡病害-咖啡炭疽病

安全採收期	農藥名稱	稀釋倍數	注意事項
14天	10%亞托敏水懸劑	900	1.病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 2.避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。
	23%亞托敏水懸劑	2,000	
	250g/L (25%w/v) 亞托敏水懸劑	2,000	
	50%亞托敏水分散性粒劑	4,500	
30天	25.9%得克利水基乳劑	1,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。
45天	23.6%百克敏乳劑	3,000	1.病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 2.避免與滲透性強的展著劑混合使用，以免發生藥害。



表二、咖啡蟲害

安全採收期(天)	農藥名稱	稀釋倍數	咖啡軟介殼蟲類	咖啡盾介殼蟲類	咖啡粉介殼蟲類	咖啡東方果實蠅	注意事項
0	97%礦物油乳劑	200	●	●			害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。
0	95%礦物油乳劑	200	●	●			
7	25%布芬淨可濕性粉劑	1,000	●				
7	40%布芬淨水懸劑	1,500	●				
15	2.8%第滅寧水基乳劑	1,500				●	
15	2.8%第滅寧乳劑	1,500				●	
15	2.4%第滅寧水懸劑	1,500				●	
35	25%陶斯松可濕性粉劑	1,000			●		
35	50%陶斯松可濕性粉劑	2,000			●		
35	22.5%陶斯松乳劑	1,000			●		
35	40.8%陶斯松乳劑	1,500			●		
35	44.9%陶斯松乳劑	2,000			●		
35	40.8%陶斯松水基乳劑	1,500			●		
35	75%陶斯松水分散性粒劑	3,000			●		