

葡萄清園做得好，

蟲害減少沒煩惱

文圖/于逸知

炎炎夏日，溫室與一期葡萄至此大多已採收完畢。為了避免害蟲於園內孳生，不論選擇接續二期葡萄的栽培，或休園養枝，正確的清園操作都是相當重要的。葡萄清園的重點如下：

- 一、盡速移除殘枝落葉，避免害蟲轉移：在果串轉色時期，多數農友都會減少或停止用藥，造成田間害蟲密度升高。剪枝時，大部分害蟲會隨殘枝一同被移除，若將這些殘枝落葉堆放於田間，藏於其中之害蟲將有機會脫離殘枝，躲藏於田間死角(如夜蛾幼蟲)或重回於植株(如介殼蟲)上，造成後續危害。
- 二、清理田間雜草與其他作物，避免害蟲躲藏：當枝條被剪除後，害蟲(夜蛾、薊馬、紅蜘蛛等)無法棲身於葡萄植株上，轉而躲藏於田間雜草與其他作物上。故應同時清除田間雜草及其他作物；若是草生栽培則應慎選地被種類，並控制其生長高度，避免成為害蟲棲身之處。
- 三、善用推薦藥劑進行田間消毒：剪枝清園後，可選用植保手冊推薦藥劑如賽洛寧2.8%乳劑1,000倍、亞滅培20%水溶性粉劑4,000倍或克凡派10%水懸劑1,000倍等進行田間消毒，降低殘存害蟲密度。



▲剪除的枝葉清掃集中後，應儘速移出田間，避免害蟲躲藏孳生