行政院農業委員會臺中區農業改良場 新聞稿

彰化縣大村鄉松槐路 370 號

中華民國 106 年 2 月 6 日

入冬首波寒流即將來襲，臺中場籲請農友儘速做好作物防寒措施！

依據中央氣象局發布之氣象預報資訊，入冬首波寒流將於 2 月 9 日至 2 月 13 日襲臺，2 月 12 日(週日)為本次寒流威力最強的時候，臺中、彰化及南投地區清晨和入夜均可能出現攝氏 9~10℃之低溫。行政院農業委員會臺中區農業改良場呼籲農民針對當前主要栽培作物儘速做好防寒管理措施。

一、水稻：

中部一期稻作育苗階段的秧苗綠化應以覆蓋透明塑膠布或不織布來保溫，唯覆蓋塑膠布，在晴天無風時應適時翻開塑膠布降溫與通風，以避免塑膠布內溫度升高，熱傷秧苗。未插秧田區於寒流來時應暫停插秧，秈稻品種較不耐寒，應於寒流過後再行插秧，已插秧田區，應維持田間 3 公分以上的水放流灌溉進行保溫，以避免寒害的發生，特別是栽培秈稻品種之田區。

二、果樹作物：

果園北面搭設防風網可防止寒風直接吹襲，以延緩落葉之發生。葡萄萌芽生長勢弱者可儘早疏芽，使養分集中促進新梢生長，高接梨剛嫁接者接穗可套小型塑膠袋保護。枇杷之花穗、果實利用套袋或覆蓋以保護避免直接受到低溫影響。寒流時可於日出前噴水降低結霜可能性，果園灌水可防止地溫急降而傷害根部。

三、蔬菜作物：

中部地區目前以栽培冬季裡作之耐寒蔬菜為主，寒流影響較低，但仍建議進行田間灌水及畦面覆蓋塑膠布、稻草等，以維持土壤溫度，或於菜園北面架設防風網，減低冷風吹襲。甘藍、大白菜及蘿蔔等十字花科蔬菜在低溫期易有抽苔問題，建議延緩移植或播種，避免造成小株抽苔。幼果期之果菜類蔬菜可利用套袋以避免果實直接與低溫接

觸。設施蔬菜栽培者，可將側覆蓋降下以提高設施內溫度，待氣溫上升再將塑膠布略掀開以避免溫濕度過高造成病害發生。

四、花卉作物：

露天栽培切花，如百合、唐菖蒲、菊花、麒麟草等，栽培時畦面應鋪設防草蓆、塑膠布或稻桿等，協助減緩土溫降低速度，或加強北面防風網，避免寒流直接侵襲。洋桔梗、菊花、非洲菊、玫瑰、滿天星等設施栽培切花及設施盆花，應於即時確認設施通風口覆蓋及密封之保溫工作，避免因低溫造成生長停滯，待氣溫回升時，則應適時調整設施之通風性，以免蓄積高溫及高濕而造成傷害。

五、雜糧作物 ：

甘藷、落花生與薏苡如已播種且生長為幼苗期，應於寒害前淺灌水，保持土壤濕潤減少低溫傷害。

聯絡人：推廣課　蔡本原
電　話：(04)8523101 轉 420
e-mail：tsaiby@tdais.gov.tw
傳　真：(04)8524784

撰稿人：蕭政弘
電　話：(04)8523101 轉 200
e-mail：hsiao@tdais.gov.tw



圖 1. 已插秧田區應維持田間 3 公分以上的水放流灌溉進行保溫，以避免寒害的發生



圖 2. 瓜果類蔬菜幼苗可利用隧道式塑膠棚進行防護



圖 3.薑幼苗可利用塑膠布覆蓋畦面以防低溫寒害