



山茶科等作物近期藥劑延伸簡訊

文/茶作技術課 林秀樂
(電話：03-4822059轉226)

依據中華民國105年11月29日防檢三字第1051489078A號函及105年12月16日防檢三字第1051489212A號函，新公告延伸使用藥劑之作物範圍包括茶、山茶科(茶、油茶及山茶花等)、菊花、咖啡與油茶，整理如下表一至五，本次公告延伸藥治防治對象鱗翅目昆蟲包括茶蠶、茶捲葉蛾類、茶毒蛾、夜蛾類、刺蛾燈蛾類、擬尺蠖蛾、避債蛾類、小白紋毒蛾等；葉蟬類害蟲包括茶小綠葉蟬。敬請各位農友注意藥劑使用，若有任何問題請洽茶改場及各分場與工作站植物保護同仁。

表一、茶

病蟲害種類	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
茶赤葉枯病	39.5%扶吉胺水懸劑	0.5公升	2,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥1次。	1.標示加註具呼吸中等毒及中度皮膚過敏性；魚毒警告(水生生物劇毒)，勿使用於「飲用水水源水質保護區」或「飲用水取水口一定距離內之地區」。 2.採收前9天停止施藥。
炭疽病	43.7%三氟敏水懸劑	0.3-0.9公升	3,400	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
	500g/L三氟敏水懸劑	0.3-0.8公升	4,000		
	50%三氟敏可濕性粒劑	0.3-0.8公斤	4,000		
葉蟬類	39.5%扶吉胺水懸劑	0.75-1公升	2,000	害蟬發生初期施藥1次，必要時隔7天施藥1次。	1.老葉受害時務必進行防治。 2.具中度眼刺激，中度皮膚刺激及過敏性。對水生生物劇毒，禁用於水域、空中施藥及大面積施用。 3.採收前9天停止施藥。



(續表一)

病蟲害種類	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
夜蛾類、毒蛾類	1%賽洛寧可濕性粉劑	0.3-0.9公斤	700	害蟎發生初期施藥1次，必要時隔7天施藥1次。	採收前10天停止施藥。
	5%賽洛寧可濕性粒劑	0.3-0.9公斤	3,500		
	2.8%賽洛寧乳劑	0.5-1.5公升	2,000		
	2.8%賽洛寧水懸劑	0.5-1.5公升	2,000		
	2.46%賽洛寧膠囊懸著劑	0.5-1.5公升	2,000		
	2.5%賽洛寧微乳劑	0.5-1.5公升	2,000		

表二、山茶科(包含茶與油茶)病蟲害延伸藥劑

病蟲害種類	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
茶赤葉枯病	500G/L(50%W/V)三氟派瑞水懸劑	0.3-1公升	4,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔14天施藥1次。	採收前14天停止施藥。
鱗翅目害蟲	2.4%第滅寧水懸劑	0.3-1.0公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次。	茶葉採收前10天停止施藥，茶籽、油茶籽採收前21天停止施藥。
	2.8%第滅寧乳劑				
	2.8%第滅寧水基乳劑				
葉蟬類	20%達特南水溶性粒劑	0.3-1公斤	3,000	對蜜蜂毒性高、避免開花期使用。採收前15天停止施藥。	
白粉病	80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	0.3-1公斤	1,000		避免與強酸性藥劑混合使用。
	84.2%三得芬乳劑	1公升	1,000		採收前21天停止施藥。
鱗翅目害蟲	54%鮎澤蘇力菌NB-200WG	0.8-1公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥。	



表三、杭菊病蟲害延伸藥劑

病蟲害種類	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
炭疽病	27.3%三氟得克利水懸劑	0.1-0.4公升	2,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥1次。	採收前21天停止施藥。
薊馬類	43%佈飛松乳劑	0.3-1.3公升	800		採收前21天停止施藥。
	1%賽洛寧可濕性粉劑	0.4-1.4公斤	700		採收前28天停止施藥。
	5%賽洛寧可濕性粒劑	0.1-0.3公斤	3,500		
	2.8%賽洛寧乳劑	0.1-0.5公升	2,000		
	2.8%賽洛寧水懸劑	0.1-0.5公升	2,000		
	2.8%賽洛寧膠囊懸著劑	0.1-0.5公升	2,000		
	2.8%賽洛寧微乳劑	0.1-0.5公升	2,000		
鱗翅目害蟲	2.5%畢芬寧水懸劑	0.3-1公升	1,000		採收前15天停止施藥。
	2.8%畢芬寧乳劑	0.3-1公升	1,000		避免與強酸性藥劑混合使用。
白粉病	80%碳酸氫鉀水溶性粉劑	0.3-1公斤	1,000		高溫度下提高施用濃度，可能引起植株幼嫩部位發生藥害。
	95%礦物油乳劑	0.5-2公升	500		
	99%礦物油乳劑				

表四、咖啡蟲害延伸藥劑

病蟲害種類	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項
夜蛾類	22.5%陶斯松乳劑	0.7-1.5公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次。	採收前35天停止施藥。
	25%陶斯松可濕性粉劑	0.7-1.5公斤	1,000		
	40.8%陶斯松乳劑	0.4-0.8公升	1,800		
	40.8%陶斯松水基乳劑	0.4-0.8公升	1,800		
	44.9%陶斯松乳劑	0.4-0.8公升	2,000		
	50%陶斯松可濕性粉劑	0.4-0.8公升	2,000		
毒蛾類	22.5%陶斯松乳劑	0.7-1.5公升	1,000		
	25%陶斯松可濕性粉劑	0.7-1.5公斤	1,000		
	40.8%陶斯松乳劑	0.4-0.8公升	1,800		
	40.8%陶斯松水基乳劑	0.4-0.8公升	1,800		
	44.9%陶斯松乳劑	0.4-0.8公升	2,000		
	50%陶斯松可濕性粉劑	0.4-0.8公升	2,000		



表五、油茶蟲害延伸藥劑

病蟲害種類	藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項		
夜蛾類	22.5%陶斯松乳劑	1-3公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥1次。	採收前21天停止施藥。		
	25%陶斯松可濕性粉劑	1-3公斤	1,000				
	40.8%陶斯松乳劑	0.6-1.7公升	1,800				
	40.8%陶斯松水基乳劑	0.6-1.7公升	1,800				
	44.9%陶斯松乳劑	0.5-1.5公升	2,000				
	50%陶斯松可濕性粉劑	0.5-1.5公斤	2,000				
毒蛾類	22.5%陶斯松乳劑	1-3公升	1,000				
	25%陶斯松可濕性粉劑	1-3公斤	1,000				
	40.8%陶斯松乳劑	0.6-1.7公升	1,800				
	40.8%陶斯松水基乳劑	0.6-1.7公升	1,800				
	44.9%陶斯松乳劑	0.5-1.5公升	2,000				
	50%陶斯松可濕性粉劑	0.5-1.5公斤	2,000				