

番石榴捲葉蛾之蟲害管理

文圖/于逸知

節角捲葉蛾 *Spilonota rorthia* 為番石榴抽稍時期最主要之蟲害。雌蛾將卵產於新稍葉芽間，幼蟲孵化後取食嫩稍與幼葉，並吐絲作巢，藏匿其中。受害新稍明顯可見食痕、蟲糞與絲巢，撥開巢穴則可見幼蟲從中竄出或吐絲垂降逃逸。受害新稍嚴重時會停止生長，影響植株發育；老熟幼蟲甚至可危害花穗及幼果，造成無法順利結果、果實傷疤或誘發病害等影響。

整枝修剪後的新稍萌芽期，須特別注意捲葉蛾的管理，修剪除去嚴重危害之嫩稍；幼果期套袋亦需注意，袋口應密閉封牢，避免蟲體鑽入危害。目前針對番石榴捲葉蛾的防治，植物保護手冊尚無推薦用藥，農友可參考番石榴粉介殼蟲類、薊馬類等害蟲所推薦的廣效性藥劑如陶斯松、賽速洛寧、克凡派等適時防治。



▲老熟幼蟲亦可取食幼果表皮，造成大面積傷疤



▲捲葉蛾幼蟲於新稍間吐絲築巢，田間辨識重點乃危害處可見食痕與蟲糞，撥開後可見絲巢與藏匿其間的蟲體