

四月病蟲害預測

作物別	病蟲害種類	發 生 地 區	防 治 要 點
水 稻	二化螟蟲	轄區水稻栽培區	以0.3%芬普尼粒劑30kg/ha、6%培丹粒劑30kg/ha、50%撲滅松乳劑稀釋1000倍或50%芬殺松乳劑稀釋1000，以上任選一種藥劑防除
柑 桔	小黃薊馬	新竹縣	48.34%丁基加保扶乳劑稀釋1000倍、
西瓜、 洋香瓜類	黃守瓜	大園、觀音、新屋、 新豐、湖口、淡水等	85%加保利可濕性粉劑稀釋1000倍。畦面覆蓋塑膠布或細紗，以防產卵。
西瓜、 洋香瓜類	銀葉粉蝨	大園、觀音、新屋、 新豐、湖口、淡水等	25%派滅淨可濕性粉劑稀釋1200倍、9.4%六伏隆水懸劑稀釋1500倍、9.6%益達胺水溶液稀釋1500倍或2%阿巴汀乳劑稀釋1000倍，任選一種防治。懸掛黃色粘板或水盤誘殺成蟲。
瓜菜類	蚜 蟲	新竹縣、桃園縣	9.6%益達胺溶液稀釋1500倍、25%派滅淨可濕性粉劑稀釋2000倍防，治任選一種防治。懸掛黃色粘板或水盤誘殺成蟲。
瓜菜類	斑潛蠅	新竹縣、桃園縣	2%阿巴汀乳劑稀釋2000倍、24%歐殺滅溶液稀釋500倍或75%賽滅淨可濕性粉劑稀釋5000倍，任選一種防治。懸掛黃色粘板或水盤誘殺成蟲。
番 茄	晚疫病	新竹縣、桃園縣	9.4%賽座滅水懸劑3,000倍、50%達滅芬可濕性粉劑4,000倍或75%四氯異苯腈可濕性粉劑600倍。
瓜 類	苗立枯病	新竹縣、桃園縣	30%殺紋寧溶液1,000倍，播種後立即灌注。
梨	赤星病	新竹縣、桃園縣	76%富爾邦可濕性粉劑200~500倍、25%比多農可濕性粉劑5,000倍，萌芽期開始施藥（果園附近之龍柏須一併施藥）。
梨	輪紋病	新竹縣、桃園縣	23%亞托敏水懸劑3,000倍、39.5%扶吉胺2,000倍，花謝後開始施藥。
梨	黑星病	新竹縣、桃園縣	40%派滅林水懸劑4,000倍、39.5%扶吉胺水懸劑3,000倍、25%比多農可濕性粉劑5,000倍、37%護矽得乳劑10,000倍。
玫 瑰	黑星病 (黑斑病)	新竹縣、桃園縣	56%貝芬硫醃1,000倍、18.6%賽福寧乳劑1,000倍。
玫 瑰	白粉病	新竹縣、桃園縣	18.6%賽福寧乳劑1,000倍