

五月病蟲害預測

作物環境課 施錫彬 分機 310 葉俊巖 分機 320

作物	病蟲害種類	地 區	防 治 藥 劑
梨	赤星病(高冷地)	轄區內台北、桃園 新竹縣市	76%富爾邦可濕性粉劑200倍、22%芬瑞莫可濕性粉劑1,000倍、25%比多農可濕性粉劑5,000倍。
	黑星病		39.5%扶吉胺2000倍、5%菲克利3000倍、37%護砂得10000倍、25%比多農5000倍稀釋液，選擇一種，發病初期開始施藥，隔7-10天施1次，共6-7次。
	輪紋病		23%亞托敏水懸劑3,000倍、39.5%扶吉胺2,000倍。
桃	褐腐病	復興、五峰	22.8%菲克利腐絕水懸劑1,000倍、42.2%腈硫醃水懸劑1,000倍。
	縮葉病		42.2%腈硫醃水懸劑1,000倍、40%四氯異苯腈700倍、5%菲克利水懸劑3,000倍
	穿孔病		16.5%鏈土黴素可濕性粉劑或68.8%多保鏈黴素可濕性粉劑1,000倍。
萵 苣	黑斑病	轄區內台北、桃園	21.2%依滅列乳劑1500倍，75%四氯異苯腈可濕性粉劑500倍。
葉菜類	苗立枯病	新竹縣市	播種後立即澆福多寧200倍或寶克隆1000倍稀釋液
番 茄	晚疫病	轄區內台北、桃園	80%免得爛500倍、75%四氯異苯腈600倍，選擇一種，發病初期開始施藥，隔7天1次，共3次。
	細菌性斑點病	新竹縣市	81.3%嘉賜銅1000倍，發病初期開始施藥，隔7天1次，共3次。
瓜 類	疫病	新屋、大園	25%依得利1500倍或50%達滅芬3000倍稀釋液，選擇一種，發病初期每株灌注500毫升，隔7-10天1次，共3-5次。
	蔓枯病		21.2%依滅列2000倍、23%亞托敏4000倍、37%護砂得10000倍稀釋液，選擇一種即可，發病初期開始施藥，隔7天1次，共3-4次。
	細菌性果斑病		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑1000倍，發病初期開始施藥，隔7天1次，共4-5次。
	白粉病		11.16%芬瑞莫10000倍、21.2%依滅列2000倍、12%邁克尼4000倍稀釋液，選擇一種，發病初期開始施藥，隔7天1次，共3次。
柿 子	角斑病	新竹縣	40%邁克尼可濕性粉劑4,000倍
水 稻	二化螟蟲	轄區水稻栽培區	以0.3%芬普尼粒劑30kg/ha、6%培丹粒劑30kg/ha、50%撲滅松乳劑稀釋1000倍或50%芬殺松乳劑稀釋1000，以上任選一種藥劑防除
蓮 花	小黃薊馬	觀音、新屋、新埔	以20%亞滅培水溶性粉劑3000倍或9.6%益達胺溶液1500倍。懸掛藍色粘板誘殺成蟲。
西瓜、 洋香瓜類	二點葉蟊	大園、觀音、新屋、 新豐、湖口、淡水等	1%密滅汀乳劑稀釋1500倍、9.6%氟芬隆水分散性乳劑稀釋2000倍、2.8%畢芬寧乳劑稀釋1500倍或18.3%芬殺蟊水懸劑稀釋3000倍任選一種防治。
西瓜、 洋香瓜類	銀葉粉蝨	大園、觀音、新屋、 新豐、湖口、淡水等	25%派滅淨可濕性粉劑稀釋1200倍、9.4%六伏隆水懸劑稀釋1500倍、9.6%益達胺水溶液稀釋1500倍或2%阿巴汀乳劑稀釋1000倍，任選一種防治。懸掛黃色粘板或水盤誘殺成蟲。
青 蔥	甜菜夜蛾	大園、竹北	1. 19.7%得芬諾水懸劑稀釋2000倍、2.8%畢芬寧乳劑稀釋666倍、9.6%氟芬隆水分散性乳劑稀釋3000倍或4.4%祿芬隆乳劑稀釋1500倍任選一種防治。
			2. 利用性費洛蒙防治：終年懸掛誘蟲盒，每分地3個，高度離地1.5公尺，1-1.5月更換誘引劑1次。
梨	二點葉蟊	新埔、芎林、竹東、 峨眉、寶山、新竹 市、五股	1%密滅汀乳劑稀釋1500倍、50%汰芬隆可濕性粉劑稀釋2500倍或18.3%芬殺蟊水懸劑稀釋3000倍任選一種防治。