

六月病蟲害預測

作物環境課 施錫彬 分機 310、葉俊巖 分機 320

作物別	病蟲害種類	發 生 地 區	防 治 要 點
水稻	縱捲葉蟲	轄區內水稻栽培區	以10%得芬諾可濕性粉劑稀釋1000倍、2.8%賽洛寧乳劑稀釋2000倍或6%培丹粒劑20公斤/公頃，以上任選一種藥劑防除
西瓜 洋香瓜類 苦瓜 胡瓜	瓜實蠅	大園、觀音、新屋、新豐、湖口、淡水等	1. 套袋 2. 25%馬拉松可濕性粉劑及蛋白質水解物400倍，開花結果後，每隔5至7天 施藥一次，施藥時不必全株噴藥，採收前7天停止施藥。 3. 85%克蠅香液劑與農藥原體原液混合之比例為20：1，以棉球沾濕置於塑膠誘殺器中，每公頃懸掛誘殺器10至20個，每個用藥5公撮，瓜類生育及開花結果期均可使用，每隔二週換藥一次。
小葉菜	斑潛蠅	桃園、大園、蘆竹、觀音、新屋、中壢 八德、楊梅、竹北等	43%佈飛松乳劑稀釋1000倍、75%賽滅淨可濕性粉劑稀釋5000倍、24%歐殺滅溶液稀釋500倍或2%阿巴汀乳劑稀釋2000倍，任選一種防治。懸掛黃色粘板誘殺成蟲。
蓮花	小黃薊馬 斜紋夜盜蟲 小白紋毒蛾	觀音、新屋、新埔	9.6%益達胺溶液稀釋1500倍防治、20%亞滅培水溶性粉劑稀釋3000倍防治。 以50%加保利可濕性粉劑800倍或90%納乃得可濕性粉劑3000倍於害蟲發生時施藥防治一次。
梨	果實蠅	新埔、芎林、竹東、峨眉、寶山、新竹市、五股	1. 套袋 2. 懸掛甲基丁香油誘殺 3. 25%馬拉松可濕性粉劑稀釋800倍及蛋白質水解物100倍點噴於非作物上。
荔枝	荔枝細蛾(果實蛀蟲、可可細蛾)	新竹市	85%加保利可濕性粉劑稀釋850倍、40.8%陶斯松乳劑稀釋1000倍、50%芬殺松乳劑稀釋1000倍，任選一種防治。
柑桔類	柑桔星天牛	八里、三峽、大溪、峨眉、北埔、關西、橫山、竹東、芎林、新埔、寶山、湖口	40.64%加保扶水懸劑稀釋100倍，將藥液噴於離地面45公分之樹幹基部。
空心菜 莧菜	白銹病	桃園、新屋、竹北	71.6%銅滅達樂600倍稀釋液，最初兩片葉展開後噴藥一次即可。
葉用甘薯	縮芽病	大園、平鎮	70%肅硫醃1000倍發病初期開始施藥，每隔7-10天1次，共2-3次。
萵苣	萎凋病	桃園、蘆竹、新屋	每分地施用孫黃添加物60-120公斤後整地，一星期後再播種。
葉菜類	苗立枯病	桃園、楊梅、大園	播種時澆灌50%福多寧3000倍稀釋液或23.2%賓克隆1000倍稀釋液，一次即可。