

七月病蟲害預測

作物環境課 施錫彬 分機 310、葉俊巖 分機 320

作物別	病蟲害種類	發生地區	防 治 要 點
水稻	水稻水象鼻蟲	各鄉鎮	田間儘量保持低水位，減少成蟲在水面下產卵。 插秧前24小時內使用3%加保扶粒劑，每箱50公克均勻施於育苗箱再灑水至飽和狀態，處理後秧苗使用插秧機移植於本田。水稻生育初期若發現成蟲每叢密度達0.5隻以上，使用3%加保扶粒劑60公斤/公頃或6%培丹粒劑30公斤/公頃，其他藥劑參考植物保護手冊。
	福壽螺	各鄉鎮	插秧前三天或當天用70%耐克螺可濕性粉劑，每公頃0.4公斤，施用前先加水稀釋後均勻施於水田，田間需保持水1-3公分。或80%聚乙醛可濕性粉劑，每公頃1.2公斤防治。
	螟蟲	各鄉鎮	0.3%芬普尼粒劑20公斤/公頃、6%培丹粒劑30公斤/公頃或50%芬殺松乳劑稀釋1000倍，任選一種防治。
	瘤野螟 (稻縱捲葉蟲)	各鄉鎮	10%得芬諾可濕性粉劑稀釋1000倍、2.8%賽洛寧乳劑稀釋2000倍或75%歐滅松可溶性粉劑稀釋1500倍防治。
瓜類	疫病	新屋、楊梅、	25%依得利1500倍或50%達滅芬3000倍稀釋液，選擇一種，發病初期每株灌注500毫升，隔7-10天1次，共3-5次。
	蔓枯病	中壢、大園	21.2%依滅利2000倍、23%亞托敏4000倍、37%護砂得10000倍稀釋液，選擇一種即可，發病初期開始施藥，隔7天1次，共3-4次。
	露菌病		72%鋅錳克絕750倍，發病初開始施藥，隔7天噴1次，共3-4次。
	白粉病		11.16%芬瑞莫10000倍、21.2%依滅利2000倍、12%邁克尼4000倍稀釋液，選擇一種，發病初期開始施藥，隔7天1次，共3次。
	炭疽病		25%撲克拉3000倍或40%四氯異苯肼600倍稀釋液，選擇一種，發病初期開始施藥，隔7天1次，共3次。
	細菌性果斑病		81.3%嘉賜銅可濕性粉劑1000倍，發病初期開始施藥，隔7天1次，共4-5次。
番茄 青椒	晚疫病(高冷地)	尖石、五峰、 復興等 高冷	9.4%賽座滅水懸劑3,000倍、23%亞托敏1,000倍、50%達滅芬4,000倍、80%免得爛500倍、75%四氯異苯肼600倍，選擇一種，發病初期開始施藥，隔7天1次，共3~5次。
	細菌性斑點病	地區	81.3%嘉賜銅1000倍，發病初期開始施藥，隔7天1次，共3次。
	早疫病(輪紋病)		80%氫氧化銅可濕性粉劑800倍、10%保拉黴素可濕性粉劑800倍、81.3%嘉賜銅可濕性粉劑1,000倍。
梨	輪紋病	新埔、尖石、	39.5%扶吉胺2000倍，間隔10天，施藥6-8次。
	黑星病	五峰、復興	39.5%扶吉胺2000倍、5%菲克利3000倍、37%護砂得10000倍、25%比多農5000倍稀釋液，選擇一種，發病初期開始施藥，隔7-10天施1次，共6-7次。
柑桔	細菌性潰瘍病	關西、新埔、 橫山、寶山、	波爾多500倍，3-4星期施一次藥，共2-6次(視梅雨期長短)。81.3%嘉賜銅可濕性粉劑1000倍或4-4波爾多液、56%氧化亞銅可濕性粉劑600倍液，隔15-20天施藥一次，若無颱風雨或雨量少於250公厘，則間隔30天施藥一次。
	黑點病	峨眉	70%腈硫脲1000倍發病初期開始施藥，隔7-10天施1次，共3-4次。
	瘡痂病(山區)	橫山	39.5%扶吉胺2000倍、40%快得寧500倍、70%腈硫脲1000倍選擇一種，發病初期開始施藥，每隔7-10天1次，共4-5次。
山藥	葉斑病	陽明山、瑞芳、	50%免賴得3000倍發病初期開始施藥，每隔7-10天1次，共5-7次。
	炭疽病	基隆、三芝	71.6%腈硫脲1000倍發病初期開始施藥，每隔7-10天1次，共4-6次。
葉菜類	苗立枯病	各鄉鎮	播種後立即澆灌50%福多寧可濕性粉劑2000倍液或23.2%寶克隆水懸劑1000倍。
萵苣	萎凋病	各鄉鎮	整地前施孫黃土壤改良劑，每分地120~250公斤，整地後一星期才可播種。
番茄	根腐疫病	平地栽培	定植時每株灌注25%依得利乳劑1000倍液，每株300~500毫升，20-30天後再灌注一次。
辣椒	炭疽病	各鄉鎮	22.7%腈硫脲水懸劑700倍液，幼果形成時施1-2次藥，而後在發病初期再施藥2-3次，間隔10天。