

八月病蟲害預測

作物環境課 施錫彬 分機 310、葉俊巖 分機 320

作物	病害	地區	防治藥劑
葉菜類	苗立枯病	各蔬菜栽培鄉鎮	播種後立即澆灌 50%福多寧可濕性粉劑 2000 倍液或 23.2%賓克隆水懸劑 1000 倍。
番 茄	根腐疫病 (平地種植)	芎林、竹東	定植時每株灌注 25%依得利乳劑 1000 倍液，每株 300~500 毫升，20-30 天後再灌注一次。
蓮 花	小黃薊馬	新埔、新屋、觀音 八德、竹北	9.6%益達胺溶液 1,500 倍、4.95%芬普尼水懸劑 2,000 倍、20%亞滅培可溶性粉劑 4,000 倍任選一種防治。
聖誕紅	銀葉粉蝨	復興、大溪、龜山 觀音、楊梅、新屋	懸掛黃色粘紙誘殺成蟲、2.9.6 益達胺溶液稀釋 1500 倍、20%亞滅培水溶性粉劑 3000 倍防治。
水 稻	螟 蟲	各水稻栽培鄉鎮	0.3%芬普尼粒劑 20 公斤/公頃、6%培丹粒劑 30 公斤/公頃或 50%芬殺松乳劑稀釋 1000 倍，任選一種防治。