

前 言

臺灣獼猴（英名：Taiwanese macaque或Formosan macaque，學名：*Macaca cyclopis*）（以下簡稱獼猴）又稱黑肢猴或臺灣猿，為臺灣特有種，也是除了人類以外臺灣唯一的靈長類動物（圖1），廣泛分布於臺灣全島各地，其中以東部及南部較多，西部及北部較少，低海拔之天然闊葉林區為主要棲地。



◎ 圖1. 臺灣獼猴

根據記載，臺灣早期中低海拔的山區，到處都有獼猴的蹤跡；後來隨著時代進步與國家社會發展需要，荒地及山林不斷地遭開發利用，獼猴的棲地遭嚴重破壞，族群數量急遽下降，曾一度被認為瀕臨絕種。78年「野生動物保育法」



公告實施，將獼猴列為保育類野生動物。由於保育政策與教育宣導有成，獼猴已甚少遭捕捉或獵殺，族群日益繁盛。根據85年~87年研究調查估計，全臺約有26萬隻；但目前（106年）獼猴數量究竟有多少？眾說紛紜，尚無定論。臺灣地狹人稠又高度開發，農地或居住生活區域常鄰近獼猴棲地，甚至與之重疊，人猴衝突時有所聞（圖2）。

◎ 圖2. 人猴衝突時，獼猴常處於弱勢一方。





由於靈長類動物（如獼猴）智力高、雜食且動作敏捷、適應環境能力強、族群具社會組織並擅於成群合作行動，因此能輕易入侵農地取食危害農作物。靈長類動物危害農作物，在世界各地均相當普遍，並非是臺灣獨有的現象。

在臺灣，獼猴列為保育類動物之前，危害農作物的問題即已存在；現今獼猴危害（以下簡稱猴害）更是成為全國性頭痛難解的農業問題。雖然臺灣關於獼猴的研究與防治已超過20年，且各地的農民、農政單位及農業技術研究機關亦不斷嘗試多種的禦防措施，但多為治標之法且效果短暫，防範成效十分有限，因此亟待尋求有效對治解決之道。

