

番荔枝強剪後病蟲害管理措施

文 / 圖 許育慈



注意清除田間殘枝落葉，減少病蟲害感染源。

番荔枝是臺東地區重要經濟果樹，種植面積 5,077 公頃，佔全國 94.1%（105 年農業年報），因栽培管理及產期調節作業，每年會進行 1 次強剪

劑。若為有機（或友善環境耕作）栽培則可選用 95% 礦物油乳劑 100 倍，全園噴施後再進行強剪。強剪後則應著重傷口保護，可施用廣效性殺菌劑，如甲基多保淨混合 95% 礦物油乳劑 100 倍全園噴施，以減少病原菌從傷口入侵。

3. 樹上樹下都要噴：多數農友施藥時只注意樹體以上，常忽略樹下地面部；由於土壤表層常是許多害蟲及病原菌孳生的場所。因此，強剪後全園消毒時，應注意地面需一併施藥防治，以避免漏網之魚成為田間的初次感染源。

若有防治上的問題，請洽本場植物保護研究室（089-325015）或洽各區病蟲害診斷服務站（免付費專線電話：0800-069-880）。

動作。有關番荔枝強剪後病蟲害管理措施，建議如下：

1. 清園管理：番荔枝強剪後的病蟲害管理工作首重清園，應該將田間枯枝、落葉，移出田間或利用乘坐式割草機將較細枝條打碎，避免堆放於樹下。
2. 強剪前後施藥防治：番荔枝強剪時，植株上的薊馬、粉介殼蟲或葉等害蟲會隨枝條、葉片落下並散落於各處。因此在強剪後的防治作業，少部分害蟲無法澈底防治，在番荔枝萌芽後回又到樹上為害。可在強剪前先防治 1 次，此時防治以害蟲為主，選用廣效性殺蟲



強剪後未清除的田間殘枝落葉，常成為病蟲害的孳生源。