

雨後請注意木瓜根腐病、疫病之防範


木瓜根腐病在豪雨後，土壤淹水之情形下常發生，可造成木瓜植株細根、支根及主根腐敗，嚴重者倒伏死亡。

木瓜疫病常發生於雨季或颱風過後，在果實方面，近熟尚未轉黃之木瓜果實發病較常發生果實疫病，病斑表面長出白色黴狀菌絲。

田間衛生管理為疫病防治最重要之關鍵，風雨過後應儘速清除落果及病果；根腐病則需注意排水，避免病害加重或蔓延。



主根腐敗



果實出現白色黴狀菌絲

防治藥劑

2種病害均可選用達滅芬、亞托敏、賽座滅、嘉賜銅、三元硫酸銅、氟比拔克等植保手冊核准藥劑（根腐病須以灌注方式施用）；或於風雨前後噴布1,000倍或灌注400倍中性亞磷酸。

蔬菜軟腐病防治要領

軟腐病好發於高溫多濕環境，大雨或颱風後尤為嚴重，罹病部位呈現水浸狀、腐爛並發出惡臭。

應即時清除病株，勿棄置田間或溝渠，以免成為感染源。氮肥勿過多，可添加鈣肥施用量，增強植株抵抗力。

防治藥劑

青蔥：嘉賜克枯爛、嘉賜銅、三元硫酸銅。

洋蔥：嘉賜銅。

十字花科蔬菜、菊科葉菜：多保鏈黴素、鏈黴素。

瓜菜類：嘉賜銅、三元硫酸銅。

芋頭：嘉賜銅、三元硫酸銅。



甘藍菜葉片發生水浸狀、腐爛病徵。



苦瓜細菌性軟腐病