講習會 Q&A

木瓜栽培管理及農藥減施

彙整／蔡文堅

一、亞磷酸和氫氧化鉀使用的方法及時機為何？

答：(一)亞磷酸：氫氧化鉀以1：1混和，稀釋約1,000倍進行葉面施用。以配製100公升為例，於100公升水中加入100公克亞磷酸，此為亞磷酸稀釋液，再加入100公克氫氧化鉀，混和均勻後即可使用。

(二)亞磷酸對疫病等病害具預防效果，沒有治療效果。應於雨季來臨一個月前施用，每7～10天噴施一次連續三次，可有效增加木瓜植株抵抗力。

二、防治木瓜銹粉介殼蟲的葵無露，油和沙拉脫的比例為何？如何調製？稀釋倍數為何？

答：油(沙拉油或葵花油等)：沙拉脫＝9：1混合充分攪拌均勻後，稀釋200～500倍施用。葵無露亦屬油劑，高溫下易造成藥害，建議於傍晚涼爽時噴施，並由較高稀釋倍數(500倍)開始施用。

三、木瓜植株葉已碰到網子，以目前時間點(7～8月)，砍掉重新發芽或2次倒株哪種方式較好？

答：(一) 7～8月木瓜植株上有果實，且植株葉已碰觸網子，此時，若行第2次倒株，易造成植株死亡。

(二)加強木瓜植株肥培管理，培養強壯樹勢，並於離地約50公分處，將主幹砍除，俾利新側枝長出。砍除傷口應予以噴藥消毒，並用報紙覆蓋保護。

四、雨季木瓜施肥以葉面或澆灌為主嗎？

答：(一)建議肥料於每年4月份雨季前進行土壤穴施，則可撐至當年10月再進行土壤肥料灑施。

(二)雨季期間可依據植株生長狀況，進行液肥葉面補充，比澆灌肥料更為速效，但建議於下午3點過後進行，以避免肥傷。

