

# 香草植物繁殖法

## (一)種子播種：

種子播種前先行浸水處理後，再按種植行株距直接點播2-3粒種子，待萌芽3-4葉時再進行疏苗留存1株。亦可利用70格塑膠育苗盤進行育苗(圖1)，待根系發展完整後再定植於本圃，可以提高幼苗成活率(圖2)。



圖1. 將香草種子每穴2-3粒播入約2cm深



圖2. 播種後5天種子發芽情形



圖3. 選取適當枝條剪至4-6cm長做為插穗



圖4. 將插穗沾發根粉後插入穴盤中可提高成活率

## (二)扦插法：

草本或木本的香草，選取未開花的頂芽，剪成長約4-6公分的枝條(圖3)，去除下部的葉片，浸在清水中約20-30分鐘後，再扦插苗床或塑膠育苗盤(圖4)，俟20-30天，幼苗葉3-5枚根群發育強健即可移植，如百里香、薄荷。

## (三)分株法：

適用於莖部較短縮且易生側芽的香草如檸檬香茅、蝦夷蔥、菖蒲。

## (四)壓條法：

以植株呈匍匐生長的迷迭香、百里香、薄荷，利用接觸地面的枝條固定再覆土，10-20天發根，切斷就可以定植成為新的植株。

## (五)走莖繁殖：

薄荷接近土表處常會發育地下走莖，也可以挖掘粗壯的走莖，留取長約5-8公分撒播於土中，也可發芽生根成為新的植株。普列薄荷取匍匐地上莖淺埋於土壤中亦會成長為新的植株。