

採收適期及採收方式

當植株已進入開花末期，下位葉開始黃化或開花後20-30天(圖1)，果萼厚實膨大，果實仍為綠色時為採收適期(圖2)，如延遲至果實褐化開裂採收(圖3)，不僅果萼纖維增加，粉介殼蟲易躲藏於果萼之中(圖4)，也會降低果萼品質。



圖1. 全園植株已進入開花末期，下位葉逐漸黃化。

果萼大小較為均一，有利於分級。收穫後之果萼成熟度一致，品質較佳，但收穫時較費工、費時，於田間勞動力充足、雇工容易的農戶通常採用此方法。

洛神葵達採收適期時，依開花次序節位陸續成熟，通常會依田間人工情況採不同採收方式：

1. 逐粒採收(圖5)：以剪刀由符合成熟標準之果萼基部剪下，果萼大小較為均一，有利於分級。收穫後之果萼成熟度一致，品質較佳，但收穫時較費工、費時，於田間勞動力充足、雇工容易的農戶通常採用此方法。
2. 一次性採收(圖6)：以利刃由果萼著生之側枝基部砍斷集中，並將側枝上具有商品價值之果萼逐粒剪下，所收穫之果萼大小、成熟度，以及品質不一，但較為省工、省時。



圖2. 果實仍為綠色時為適當之採收時期。



圖3. 果實已褐化開裂，果萼品質降低。



圖4. 過遲採收粉介殼蟲易躲藏於果萼中。



圖5. 選擇碩大飽滿的果萼，逐粒採收。



圖6. 將側枝由基部砍斷，一次性採收。