紅龍果顧品質，產量調節很重要

文圖／陳盟松

紅龍果經過半年的新梢生長後，又即將在 5 月開始進入生殖生長期，以約 15 天 1 批花的生長模式，全年產生 13-14 批以上的大量花苞，在 7、8 月達到單月最高產量。在主產季內應先瞭解市場趨勢脈動，目前紅龍果的市場出貨量高峰主要落於 7、8 月，因此要適度減少該時期的市場果實總生產量，須回推至 5 月之後，紅龍果開始形成花蕾時就必須進行產量規劃，減少留花量。為生產高品質紅龍果，需針對單株植株進行產量控制，因為紅龍果花苞產生的批次密集且有規律，連續留果容易造成樹勢提早弱化，造成小果率增加以及市場供應量遽增，而影響果品價格。為確保每批果實產出平均果重達 500 公克以上，可依據單株枝條總數，以 5 個枝條留 1 果模式進行留果作業。同時要搭配隔批留果模式，確保每一粒果實在生長過程中均可獲得充分的養分。除此之外，在紅龍果自然生長狀態下，花苞形成數量會出現大小批的情形，利用產量調節模式，可以穩定每一批次的產量，達到計畫型生產的目標，維持樹勢及提高冬季燈照產期調節的成功率，可謂是一舉數得，好處多多。



▲植株大量留果未進行產量調節生產模式，會造成樹勢提早弱化及小果率增加，導致果實品質下降



▲採用 5 個枝條留 1 果及搭配隔批留果的產量調節模式，可以穩定果實產量及生產優質果品