蕎麥品種及栽培技術介紹

文圖／廖宜倫、賴坤良

國內蕎麥推廣品種有二，分別是屬普通蕎麥‘台中 5 號’及韃靼蕎麥‘台中 2 號’。普通蕎麥的花為白色，具有豐富的蜜源可吸引昆蟲及蜜蜂採蜜，為蟲媒花，故為冬季重要的蜜源作物。韃靼蕎麥的花為青色，花為不完全展開，可自花授粉，韃靼蕎麥的芸香苷含量多於普通蕎麥，故近年來受到人們重視。在台灣蕎麥採冬季裡作栽培，生長期由每年 10 月至隔年 2 月，因其生長期短，不會影響隔年一期稻作期，受到農民喜愛。本文介紹栽培技術如下：

(一)播種期

蕎麥為冬季裡作，慣行播種期以 10 月下旬至 11 月下旬為主，如太早播種，幼苗生育期時溫度太高，使得開花提早，全生育日數縮短；反之，如至 12 月中旬後較晚播種，因光照長度及溫度影響致結實率不佳，進而影響產量。

(二)整地及播種方式

播種法可分為不整地法、低整地法及整地法 3 種。

1. 不整地法：二期作水稻收穫前 2 個星期，稻田灌水以濕潤土壤，水稻收穫前 2 日，田間土壤仍呈濕潤狀態時，將蕎麥種子均勻撒播田間，水稻收穫後將稻稈切斷並覆蓋田面的蕎麥種子，有助於種子發芽，此方法因未進行整地而最為省工。
2. 低整地法：二期作水稻收穫前 2 個星期，引水灌溉使得土壤濕潤，水稻收穫後將蕎麥種子撒播在稻田，之後再以曳引機進行 5-7 公分的土表深度之低整地，將種子淺層覆蓋，避免種子遭受鳥害。
3. 整地法：二期作水稻收穫後，先以曳引機進行整地，並將田面耙平並做畦進行條播，或以播種機進行機械播種，行距 30 公分，此法雖最費工，但所需種子量較少，收穫產量較高。



▲普通蕎麥花海景觀

(三)播種量

普通蕎麥種子較大，每公頃需種子量約 50-60 公斤。韃靼蕎麥種子較小，每公頃需種子量約 40-50 公斤。

(四)施肥管理

蕎麥每公頃所需肥料三要素為 N：P：K=60-75：36：60 公斤。施用有機質肥料，可於基肥一次施用。

(五)收穫

蕎麥可用雜糧聯合收穫機採收，為田區蕎麥種子 90% 成熟時進行收穫。



▲韃靼蕎麥植株