



## 108 年 10 月公告增修藥劑使用方法於山茶科作物簡訊

文 / 楊小瑩\*、林儒宏  
(\* 電話：049-2753960 轉 611)

行政院農業委員會動植物防疫檢疫局 108 年 10 月 4 日公告增修「三氟派瑞」等 6 種農藥之使用方法與範圍(防檢三字第 1081489707 號)，在茶及山茶科茶類中，除公告 1.00% 賽洛寧可濕性粉劑、2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑、2.50% 賽洛寧微乳劑、2.80% 賽洛寧乳劑、5.00% 賽洛寧水分散性粒劑等 5 種藥劑延伸使用於防治葉蟬類外，還新增 5.00% 保粒黴素(丁)水分散性油懸劑於防治茶赤葉枯病之使用方法，茲整理如下表，提供農友用藥新選擇。

表一、108 年 10 月公告新增使用於山茶科作物之藥劑使用方法整理

農藥名稱	作物名稱	病蟲名稱	稀釋倍數	使用時期	安全採收期	注意事項
1.00% 賽洛寧可濕性粉劑	茶	小綠葉蟬	400	萌芽初期 害蟲發生時 開始施藥	10	避免於開花期使用
2.46% 賽洛寧膠囊懸著劑	山茶科 茶類	葉蟬類	1,000	發芽初期 害蟲發生時 開始施藥	10	—
2.50% 賽洛寧微乳劑	山茶科 茶類	葉蟬類	1,000	發芽初期 害蟲發生時 開始施藥	10	—
2.80% 賽洛寧乳劑	山茶科 茶類	葉蟬類	1,000	萌芽初期 害蟲發生時 開始施藥	10	—
5.00% 賽洛寧水分散性粒劑	茶	小綠葉蟬	2,000	病害發生初期 開始施藥	10	避免於開花期使用
5.00% 保粒黴素(丁)水分散性油懸劑	茶	赤葉枯病	2,000		— <sup>註</sup>	—

註：保粒黴素為衛生福利部所列得免訂殘留容許量之農藥，故無建議安全採收期。