



洋蔥炭疽病已現蹤 請農友注意防治

文·圖／曾敏南



洋蔥葉部受炭疽病菌感染造成長橢圓乾枯褐色斑塊並伴隨大量孢子產生



炭疽病感染擴大後葉片乾枯



葉片受害嚴重時全株乾枯，蔥球後續成長將明顯受到限制。



洋蔥田受炭疽病感染後，部分區塊植株乾枯。



近日氣溫冷熱不定，偶而低溫伴隨降雨，有時氣溫回升，濕度升高，有助於作物病蟲害發生。目前高屏地區洋蔥已進入結球期，而恆春及車城地區已有部分洋蔥出現炭疽病斑，若未及時防範可能影響後續收成，本場籲請農友及時防治，正確用藥，以避免病害持續蔓延，影響洋蔥收益。

洋蔥為屏東縣重要產業，炭疽病菌可感染蔥球鱗片及葉片，蔥球及葉片受感染後形成褐色圓形或長橢圓形乾枯斑塊，受感染嚴重時甚至全株乾枯。斑斑上可形成黑色環狀的分生孢子盤著生大量菊紅色分生孢子，分生孢子可透過風雨快速傳播至健康植株。恆春及車城地區已有部分田區受害，造成田區中的部分區塊明顯褐化萎凋。由於部分洋蔥目前已進入蔥球肥大期，正需要葉部提供養分，如果葉片嚴重受害，將阻礙蔥球肥大影響產量。

請農友把握防治時機，一發現植株受害應立即選用植物保護手冊核准用藥進行防治，若已發現植株全株乾枯，為避免大量孢子藉雨水散播，因此應先移除受害植株，再施藥防治。防治藥劑可選用28%亞托環克座水懸劑3,000倍、10%菲克利乳劑3,000倍，或23.6%百克敏乳劑3,000倍等植物保護手冊核准用藥進行防治。農友在病害鑑定或防治上如還有疑問，請直接與本場聯繫，技術人員將竭誠提供服務。