

水稻栽培及防治相關問題

彙整／蔡文堅

- 一、稻熱病發生後，噴施藥劑防治，此時稻田是要灌水3~5公分，或曬田讓根呼吸？

答：稻熱病好發生於冬末春初忽冷忽熱、日夜溫差大、露水深重的季節，約一期作插秧後30~45天。此時即應噴施稻熱病藥劑防治。若曬田時稻熱病發生，應回復灌水，使植株不再弱化。非曬田時期遇稻熱病，則按一般水分管理灌溉。

- 二、目前正值水稻施用穗肥生育階段，惟目前臺肥公司配銷給農會複合肥料(如臺肥43號等)的數量，無法滿足農民的需求，造成農民恐慌，希望政府能幫忙解決。

答：(一)臺灣目前肥料約有75%量由臺肥公司生產供應，目前臺肥公司均依照往年既定的生產計畫，正常生產，肥料供應無虞，希望農民不要聽信坊間不實傳言，購買囤積肥料，除增加金錢支出外，肥料放久了品質也會變硬變差。

(二)若一時無法買到複合肥料，也可運用購買單質肥料來調配複合肥料，其方法如下：

1. 臺肥43號肥料10包：可用硫銨6包、過磷酸鈣2包及氯化鉀2包，混合攪拌均勻調製出10包臺肥43號肥料效果。
2. 臺肥4號肥料10包：可用硫銨5包、過磷酸鈣 $1\frac{2}{3}$ 及氯化鉀 $3\frac{1}{3}$ 包，混合攪拌均勻調製出10包臺肥4號肥料效果。