

茶角盲椿象春茶防治時機

文圖 / 茶作技術課 林秀欒
（電話 :03-4822059 轉 226）

茶角盲椿象為茶樹重要害蟲之一，主要造成茶嫩芽葉之危害，若蟲及成蟲皆會刺吸嫩葉及幼梢之養分，輕者被發害部呈暗褐色斑點 (圖一)，危害嚴重時新葉褐變乾枯 (圖二)，被害芽停止生長呈乾枯 (圖三)，造成嚴重之茶菁產量損失。

此外，若茶角盲椿象發生在晚生種茶樹茶園，如青心大冇、青心烏龍等品種，如在春季，當環境溫度漸升，茶角盲椿象之族群量增加，但茶芽尚未大量出現時，茶角盲椿象則會取食未萌發之芽點，造成該芽點焦黑死亡無法萌發長大 (圖四)，直接影響春茶茶菁產量。

本場於本 (109) 年 3 月初及月中針對茶角盲椿象發生嚴重之青心大冇茶園進行 2 次藥劑防治，結果顯示除了茶角盲椿象族群有效被抑制外，受害茶芽旁之側芽亦萌發新芽，可健康生長。故建議針對茶角盲椿象好發之茶園需在春季自 2 月底即進行本害蟲的防治，以降低對春茶茶菁品質與產量之影響。



圖一、茶角盲椿象危害茶嫩芽葉初期成褐色斑點病徵。



圖二、茶角盲椿象危害茶芽葉嚴重時會使茶芽葉乾枯。



圖三、茶角盲椿象危害未萌發之茶芽



圖四、若無適當控制，茶角盲椿象危害剛萌發之茶芽。