

### 一、如何培養放射線菌防治根瘤線蟲？

答：番石榴根瘤線蟲整合性防治方法介紹如下：

- (一)番石榴強剪及長新梢時，於樹冠外緣垂直下方環狀挖溝約15公分深，施以丁基加保扶粒劑200公克/株，另將蝦蟹殼粉及蓖麻粕以5：2比例混合，每株施用2至2.5公斤後覆土，前述操作約經2週後，再施1次。
- (二)再過1週後，每株植株根圈灌注以稀釋500倍之放線菌1公升，連續灌注3次。
- (三)最後在果園種植萬壽菊(每分地撒播1公斤種子)，於萬壽菊生長後期，再施用蝦蟹殼粉及蓖麻粕，惟不可太靠近番石榴植株莖部，宜在樹冠以外，且翻犁埋入土中，才能達最佳效果。

### 二、建議多久施1次追肥？6~9月雨季，是否減少地面施肥，增加葉面施肥？

- 答：(一)追肥分別於開花期、幼果期及採收期，分3次施用，可採穴施、撒施及溝施。
- (二)番石榴植株於6~9月間適逢營養生長期，需做好田間的排水措施，並以穴施或溝施的方式施肥，以培養強壯的樹勢及健康的葉片，也可避免肥料的流失。

