



明年棗果要質優 授粉疏果齊步走

文·圖／李文豪



棗為高屏地區重要熱帶水果，農友通常會利用產期調節技術讓產季落在農曆年前後，以供應春節送禮自用最佳果品。今年棗雖無颱風摧殘，但因明年農曆過年較晚（國曆2月12日），為使產期順利調整到1月中下旬，普遍使其著果延後。為生產高品質果品提升棗的市場利潤，本場呼籲農友，厲行疏果提升棗的節令品質，以穩定的品質確保消費者購買意願。

臺灣棗108年栽培面積1,848公頃，年產量33,221公

噸，高屏地區為最重要的產區，占栽培面積73%。本場致力於棗育種工作，至今育出9個各具特色的品種，推出後廣獲消費者

好評。目前栽培面積較多的為過年前的「高雄8號－珍寶」及「高雄12號－珍愛」；過年後的「高雄11號－珍蜜」，因明年農曆年較晚緣故，消費者大有機會在年前即可品嚐到味美多汁棗果品。本場近年推出的這些優良品種已成市場主流，而其首要品質生產關鍵即在厲行疏果。

今年因產地無颱風影響，棗枝條、花芽發育正常，往年為因應年節市場需要，棗子在白露前要著果，但由於明年過年較晚，果園大多採延遲著果，另有部分區域因降雨易導致授粉不良，本場建議目前著果量少的果園，應持續加強授粉媒介昆蟲飼育，促進著果。而著果順利後，疏果工作的確實與否對棗果實品質影響甚鉅，建議厲行疏果並及早進行，以利生產高品質棗果。

提醒農友，為了生產又大、又甜又多汁的棗子，提高消費者購買意願，應加強整枝修剪及掌握疏果要領：

- 一、**疏果前**先剪除細弱枝梢、交叉重疊枝及樹冠上方未結果的徒長枝，較易判斷適當的留果量，也可改善日照及通風，減少病蟲害發生。
- 二、**開始疏果時**要優先疏除擦傷及病蟲害果，無葉片、葉片老化、細弱枝梢或枝梢尾端的果實也應一併疏除。
- 三、**原則上4~5節留1果**，日後果實成熟時，結果枝就不會折斷，也不必施行吊枝作業。

品質不良雖可能是肥培管理不當或氣候等因素影響，但留果量過多常是主因；若能適時疏果、留果量適中，棗子果粒大、糖度高、質地脆且多汁，特級品較多，無論拓展內銷品牌或是外銷市場，都能無往不利。

充分疏果可獲得品質穩定果品



A 部分區域受雨水影響導致著果情況不良



B 受雨水影響導致著果情況差，果園需持續飼養授粉媒介昆蟲。



C 著果情況良好，應厲行疏果確保果實品質。



D 著果順利可先將枝條尾巴或細枝花序摘除，減少養分消耗及疏果工作。