

雨後慎防蓮霧病害 預警



文·圖／陳正恩、曾敏南

近期因為強烈大陸冷氣團過境，除造成低溫外，也有零星降雨，環境濕度偏高，有助於黑腐病、果腐病和炭疽病侵染蓮霧果實。由於蓮霧發生病害感染時可產生大量孢子，或殘存在枯枝落葉，若遇雨水飛濺傳播，會順著果柄滲入套袋內引發病害。此外，蓮霧套袋後，也要時常注意植株葉片生長情況，如果葉片受感染產生乾枯病斑，亦應適時清理或施藥防治，以防治葉片上的病原菌經雨水淋洗進袋中。

為防範蓮霧病害，農友務必作好清園工作，隨時清除罹病枝條、落葉及落果，套袋時應選用「新袋」，並仔細將袋口包覆完全，降低雨水流入。另應適時進行植株修剪，使果園通風良好，不僅可減少病害發生，也有利於藥劑防治作業。

使用化學藥劑防治時，選用能同時防治多種病害的藥劑，可節省用藥並增進防治效率，例如39.5%扶吉胺水懸劑，或62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑可同時防治黑腐病、果腐病和炭疽病；38%白列克敏水分散性粒劑則可同時防治果腐病和炭疽病。

- A** 蓮霧果實受黑腐病感染後可產生大量菌絲及孢子
- B** 病原菌亦可感染葉片造成乾枯，受害組織上的分生孢子可經由雨水飛濺傳播。
- C** 應落實清園，將田間病葉落果清除，以減少感染源。
- D** 蓮霧套袋時應確保縮口完全，減少雨水滲入。

