

# 蓮霧及荔枝相關問題



## 一、蓮霧果實成長期，如何掌握水分管理，俾能讓果實肥大並兼顧品質不裂果？

答：依據果園特性不同，若果實因缺水或根系弱而生長停滯時，可於傍晚灌溉，有助於促進果實增大；若裂果風險較高的時期，灌溉時機則以上午較佳。



## 二、蓮霧果實果蒂端皺縮(軟頭)，是何原因？如何解決？

答：1. 蓮霧若遇低溫(12℃以下)時間較長，可能造成根系吸收水分、養分的能力受阻，通常會造成果實落果，若未發生落果，因供水減少，可能造成掛樹果實失水軟化。

2. 蓮霧果園做好防寒設施，如於果園四周黑色塑膠網圈圍防寒；另於寒流來襲時灌水保濕保溫。

## 三、荔枝矮化修剪後，萌出的枝條，需要疏剪嗎？

答：需疏枝，一般留2~3枝作為未來主枝，並加強營養及病蟲害管理，待長2~3次梢成熟後，再進行短剪，以培養側枝條。

## 四、荔枝細蛾於果實多大時，侵入危害？如何防治？

答：果實成長期之每個階段皆會侵入危害。做好清園降低蟲源，藥劑輪替使用降低抗藥性，藥劑噴及害蟲棲息處(樹冠內)。

## 五、荔枝樹生長勢不佳，一邊枝條正常一邊枝條弱勢枯枝，請問要如何解決？

答：建議植株整枝修剪，培養新枝條，並酌量施用有機肥及開根素，以恢復生長勢。

