



# 109 年 11 月公告與修正「美速隆」等 11 項農藥使用方法及其範圍

文 / 楊小瑩\*、林秀樂、林儒宏  
(\* 電話：049-2753960 轉 611)

行政院農業委員會 109 年 11 月 30 日農授防字第 1091489570A~K 號公告「美速隆」農藥之使用方法及其範圍，與修正「達滅克敏、白列克敏、賜諾特、賜滅芬、嘉賜克枯爛、伏滅鼠、百克敏、歐索林酸、賽派芬、曼普胺」等 11 項農藥使用方法及其範圍。在茶及山茶科茶類中，本次公告與修正並未新增藥劑使用方法，僅在「百克敏」農藥使用方法中，新增水懸劑 (SC) 劑型，此藥劑登記在茶樹上是用以防治赤葉枯病與茶餅病 (表一)，和原本乳劑 (EC) 劑型相比，水懸劑是較為安全之劑型，可減少有機溶劑使用以降低農民用藥時的暴露風險。

表一、23.6% 百克敏於茶樹之藥劑使用方法

農藥名稱	作物名稱	病蟲名稱	每公頃每次用量	稀釋倍數	使用時期	安全採收期 (天)
23.6% 百克敏乳劑	山茶科茶類	赤葉枯病	0.3-1 公升	3,000	病害發生初期開始施藥	21
23.6% 百克敏乳劑	茶	茶餅病	0.33 公升	3,000	病害發生初期開始施藥	21
23.6% 百克敏水懸劑	山茶科茶類	赤葉枯病	0.3-1 公升	3,000	病害發生初期開始施藥	21
23.6% 百克敏水懸劑	茶	茶餅病	0.33 公升	3,000	病害發生初期開始施藥	21