

# 認識草莓二點葉蟥危害及防治方法

文、圖/王珮涵

草莓栽培期間的主要害蟲包含蛾類、蚜蟲類、薊馬類與蟥類等，其中二點葉蟥的發生通常配合草莓的生育期，即開花至結果期都可能受害。如受害初期不及早防治，常會造成植株弱小、果實小且無光澤，並降低商品價值。

二點葉蟥一般分布於葉片背面，多沿葉脈或凹陷處產卵以及吸食植物汁液，密度較高時部分葉蟥會移至葉片表面，危害初期可在葉面觀察到淡黃色小點，危害嚴重時

造成葉片黃化或褐化、枯萎而致提早落葉，影響光合作用及植株生長。當二點葉蟥密度過高時會有向上爬行的特性，並在葉尖或葉緣聚集成團後隨風飄散。二點葉蟥的發生多經由風吹飄入、人員在葉蟥密度高的地方操作走動，或透過農機具沾黏蟲體傳播至其他植株。

防治方法：

1. 清除田間雜草、殘株及落葉，減少發生源。

2. 水旱輪作或種植前淹水1個月，降低田間蟲源。


3. 非化學農藥防治：施用油劑，不過須注意應避免在高溫時使用油劑，否則容易使葉片受傷。

4. 化學防治：參考政府公告草莓二點葉蟥核准防治用藥，選用不同作用機制之藥劑輪替使用，尤其注意要向葉背噴灑，並使藥劑均勻覆蓋。

5. 生物防治：釋放草蛉等天敵，可減緩葉蟥族群的增長。



二點葉蟥危害初期，葉面可見到淡黃色小點



二點葉蟥密度高時，可見葉蟥於葉上結網



二點葉蟥