

**注意!**

# 秋行軍蟲來吃芭樂了!!



文／朱堉君、陳正恩、陳明吟 圖／陳正恩



各位農友請注意！日前接獲農友通報，在高雄市燕巢和大樹果園發現秋行軍蟲啃食芭樂果實，目前行政院農業委員會已於111年5月12日公告4種緊急防治藥劑，同時本場作物環境課植保研究人員亦迅速地更新藥單－番石榴病蟲害防治用藥摘要表，詳細資料請至所附網址參用(<https://reurl.cc/8oNYpj>)

，敬請農友正確用藥並遵守安全採收期。

目前觀察秋行軍蟲主要危害成熟期果實，部分田區同時也有斜紋夜蛾來參一咖，各位農友的芭樂

如果已發育到中果期，務必注意防範。農友平時應加強果園田間衛生管理，若有看到鱗翅目幼蟲或卵塊，應即時移除並防治，且在套袋後仍要持續注意田區狀況，以防幼蟲鑽入袋內危害。農友若有問題，敬請逕洽本場植保研究室病蟲害診斷窗口(08-7389060)。

## 番石榴－秋行軍蟲緊急防治藥劑使用方法及其範圍

| 藥劑名稱                                             | 每公頃每次施藥量  | 稀釋倍數  | 施藥時期及方法                 | 注意事項          |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------------------------|---------------|
| 5.87%賜諾特<br>SC(spinetoram)                       | 0.8-1.3公升 | 1,600 | 害蟲發生時開始施藥，<br>每隔7天施藥一次。 | 採收前7天<br>停止施藥 |
| 11.7%賜諾特<br>SC(spinetoram)                       | 0.4-0.6公升 | 3,200 | 害蟲發生時開始施藥，<br>每隔7天施藥一次。 | 採收前7天<br>停止施藥 |
| 48.1%<br>(35,000DBMU/MG)<br>鮎澤蘇力菌<br>ABTS-1857WG | 1.5-2公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，<br>每隔7天施藥一次。 |               |
| 54%<br>(15,000IU/MG)<br>鮎澤蘇力菌<br>NB-200WG        | 1.5-2公斤   | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，<br>每隔7天施藥一次。 |               |

(依據行政院農業委員會111年5月12日農授防字第1111488829A號公告)  
其他有關秋行軍蟲資訊請參考－防檢局秋行軍蟲專區(<https://reurl.cc/2ZE7Y6>)