




謝花後就下手 滅細蛾護幼果行動即刻啓動

文・圖／陳明吟



荔枝細蛾成蟲產卵於果實表皮凹陷處



荔枝細蛾成蟲喜歡棲息於枝條下方

目前高屏地區的玉荷包荔枝花期已進入尾聲，喜歡取食荔枝果實的「蒂頭仔蟲」（荔枝細蛾），在荔枝果實綠豆大時就會在果皮上產卵，孵化後的幼蟲隨即蛀入果實內危害，本場提醒農友－此時為重要的防治時機。由於成蟲喜歡棲息在枝條下方，所以噴藥時應加強樹冠內的枝條噴灑，並自荔枝小果期就要注意防治，避免害蟲數量遽增而影響荔枝收成。

荔枝細蛾成蟲喜歡棲息於陰暗處，並在夜晚交配產卵。荔枝營養生長期間，細蛾幼蟲可鑽入新梢的髓部取食，造成嫩枝空心，導致新梢生長不良且易折斷；結果期時，成蟲可產卵於果實表皮，幼蟲孵化後即直接蛀入果實內部危害。在果肉尚未包裹種子前，幼蟲蛀食種子；當果肉開始生長並包覆種子後，幼蟲則蛀蝕果蒂處，受害果實提早脫落，造成嚴重落果，部分收成果實蒂部常見細蛾幼蟲及蟲糞，使得商品價值降低。

由於高屏地區的荔枝已陸續進入小果期，本場籲請農友密切注意細蛾的防治，選擇核准用於防治荔枝細蛾的藥劑，如亞滅培、芬殺松、加保利、撲滅松、第滅寧或益洛寧等，或參考農藥資訊服務網(<https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Bug>)選擇合適藥劑。施藥時選擇作用機制不同的藥劑輪流使用，以避免抗藥性產生。此外，成蟲喜歡棲息於枝條下方的陰暗處，可加強該部位的施藥。農友在害蟲鑑定或防治上如有進一步問題，歡迎逕洽本場，技術人員將竭誠為農友服務。