



氣候潮濕多雨 慎防蓮霧病害


文・圖／陳正恩

時序雖已入秋，但近期因颱風及鋒面影響，使得南部仍偶有零星短暫雨，甚至大雨。在雨水多、濕度高的環境下，蓮霧果腐病、黑腐病和炭疽病等病害常隨之發生，本場提醒農友多加注意病害防治，以確保果實品質與收益。

高屏地區多數蓮霧於10～4月間採收，採收期前若降雨較頻繁，環境濕度高，常可發現套袋後果實受到果腐病、黑腐病和炭疽病菌等危害，導致大量落果。病害感染時可產生大量孢子，除感染果實外，亦可殘存在枯枝落葉，若遇雨水飛濺傳播，會順著果柄滲入套袋內引發病害。

為防範蓮霧病害，農友務必作好清園工作，隨時清除罹病枝條、落葉及落果。果實套袋時，避免重複使用紙袋，並仔細將袋口包覆完全，以減少雨水滲入袋內並將病原菌帶入的風險，另應適時進行植株修剪，使果園通風良好，不僅可減少病害發生，也有利於藥劑防治作業。

使用化學藥劑防治時應對症下藥，並輪用不同作用機制藥劑，以降低病原菌產生抗藥性風險。藥劑選擇上務必使用蓮霧登記藥劑，且遵照稀釋倍數及安全採收期，以確保果品安全，例如可選用38%白列克敏水分散性粒劑防治果腐病、39.5%扶吉胺水懸劑防治炭疽病。亦可選用能同時防治多種病害的藥劑，以節省用藥並增進防治效率，如62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑可同時防治黑腐病、果腐病和炭疽病。農友如有用藥或防治上的問題，可直接與本場聯繫，技術人員將極力提供協助。



蓮霧受果腐病等病害感染



病原菌也可感染葉片，受害組織上的分生孢子可經由雨水飛濺傳播。



蓮霧套袋時應包覆完全，減少雨水滲入機會。



落實清園，加強田間衛生，減少感染源。

相關網址：

- 農藥資訊服務網 <https://pesticide.aphia.gov.tw/information/>
- 植物保護資訊系統 <https://otserv2.tactri.gov.tw/ppm/>
- 本場作物安全用藥資訊 <https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665>