



在果菜市場，我們總能買到一顆接著一顆鮮嫩多汁、香甜可口的蓮霧。然而，你可知道，蓮霧在自然情況下的生產季節是每年5至7月的夏果嗎？這些出現在12月至翌年5月的冬果與春果，背後其實藏著農友們精心運用產期調節技術的成果，不僅延長蓮霧的產期，也為我們的餐桌帶來更多的選擇。

夏季的高溫雖然有利於蓮霧的生長，但高溫多雨的氣候條件卻增加病蟲害的風險，也容易導致果形偏小、果實著色不佳等問題。因此，為了提升果品質量並穩定市場供應，農友通常會選擇在秋冬季節進行產期調節，以避開夏季不利的氣候條件。

農友常操作調節蓮霧的產期技術，包括：調控光照，抑制樹體營養生長的黑網覆蓋；製造逆境，迫使樹體從營養生長轉為生殖生長的浸水或灌肥料製造肥傷的處理；通過抑制養分流通，誘導花芽分化的環狀剝皮或斷根法。

根據樹體狀況、土壤特性、氣候條件等因素，農友會選擇適合的管理方式，包括中度修剪後培養一次梢再蓋黑網(農友俗稱「二局」)、重度修剪後培養三次梢再蓋黑網(農友俗稱「三邦茛」)及不以蓋黑網作為產期調節方法的傳統法，搭配其他技術進行綜合調控。

不同的產期調節方式各有利弊。例如，傳統法製造逆境來產期調節簡單有效，但稍有不慎可能損害樹體健康。而「二局」法需要精準的枝條修剪技術，對寒害的抵抗力也更佳；「三邦茛」法則能培養更強健的樹體，但病蟲害防治會更加困難。

農友們會根據自身經驗、技術能力和市場需求，選擇最適合的方式。今年由於去年多次颱風侵襲臺灣，產期調節的操作充滿挑戰，但每一顆蓮霧都凝聚了農友的智慧與堅韌，他們不僅克服氣候挑戰，為我們帶來了甜美多汁的蓮霧，還延長了享受這份美味的季節。

作者簡介

姓名：許雅涵
畢業學校：國立中興大學植物醫學暨安全農業碩士學位學程
駐點農會/試驗單位：枋寮地區農會
負責區域：屏東縣枋寮鄉及春日鄉
服務項目：作物病蟲害診斷、鑑定、防治諮詢及栽培管理諮詢
連絡電話：08-8785121#119



蓮霧謝花著果期，俗稱「批仔」。



農友利用黑網遮光，對蓮霧進行產期調節。



蓮霧花苞期，俗稱「大白肚」。



蓮霧套上蔬果套可避免碰撞損傷